



イチゴ編



病害虫注意報
2017年4月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫も終盤ですが最後まで病害虫を蔓延させないために防除を行いましょう。

収穫中 おすすめローテーション⑤

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハバチ	ミコ	刊
4月①	灰色かび病 うどんこ病	カリグリーン ※野菜類登録	800~ 1,000倍	前日	—	0日	0日	—	—
			※灰色かび病は800倍						
4月②	ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日	2回	1日	0日	—	—
			卵 成虫 速 残効						
4月③	うどんこ病	ベルコート水和剤	4,000倍	前日	2回	0日	0日	—	—
	ハダニ類 アザミヤダニ類	カウンター乳剤	2,000倍	前日	4回	1日	0日	—	—
4月④	炭疽病 うどんこ病 灰色かび病	シグナムWDG	1,500~ 2,000倍	前日	2回	—	0日	—	—
			※炭疽病・うどんこ病は2,000倍						
4月⑤	ハダニ類、コガネムシ類 アザミヤダニ類 うどんこ病	フォーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	—	—	—	—	—
			天敵注意! 成虫 幼虫 速						

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

おすすめ資材

リニューアルしました!

★グリシンベタイン 新配合★

ファイトカル

グリシンベタイン

トレハロース

Ca

有機酸



液の色も茶色になります

グリシンベタインがカルシウムのキレート化を助けカルシウムの吸収性・浸透性を向上!

新剤情報

新規殺菌剤

ネクスター フロアブル

2月23日付で 新規登録されました!
(新規成分:イノピラザム)

【登録内容】
使用倍率:1,000倍
前日/3回
対象病害:うどんこ病



4月新発売!