



# キク編



病害虫注意報  
2017年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 白さび病・害虫注意！

先月に引き続き、ハウス内は高湿度状態になりやすく、白さび病が発生しやすくなります。モヤコンを使用するなど湿度を下げる工夫を行いましょ。また、ハウス周りの雑草は病害虫の発生源となります。雑草が大きくなる前に、除草剤などを散布しましょ。

## 今月のおすすめ ローテーション

※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますためご注意ください。展着剤、葉面散布剤などを加用する場合もご注意ください。

生育  
初期

白さび病	ペンコゼブフロアブル	800倍 発病前～発病初期/ 8回
ハダニ類	ニッソラン水和剤	2,000～3,000倍 - / 2回
ヨウムシ類、アザミウマ類 アブラムシ類、ハダニ類	マラソン乳剤	2,000～3,000倍 発生初期/6回

破蕾期

白さび病、黒斑病 灰色かび病、ハダニ類 うどんこ病	ポリオキシ AL水溶剤	2,500倍 発病・発生初期/8回
ミカンキロアザミウマ ハダニ類	アグリメック	500倍 発生初期/5回
アブラムシ類 アザミウマ類	モスピラン 顆粒水溶剤	アザミウマ類2,000倍 アブラムシ類4,000倍 発生初期 / 5回

消灯時

白さび病	ラリー乳剤	3,000倍 発病初期/5回
ハダニ類	テデオン乳剤	500～1,000倍 - / -回
アザミウマ類、ア ブラムシ類、ハモグリ バエ類、カメムシ類	ダントツ水溶剤	2,000～4,000倍 発生初期/4回

発蕾期

白さび病	チルト乳剤25	3,000倍 発病初期/3回
ミカンキロアザミウマ マメハモグリバエ	カスケード乳剤	2,000倍 - / 3回
アザミウマ類 オオタバコガ	プリンス フロアブル	2,000倍 発生初期/5回

## 圃場周りの除草に

圃場周辺の雑草が大きくなる前に、除草剤を散布し、病害虫発生を抑えましょ。

### バスタ液剤

使用量: 300～500ml/10a  
雑草生育期(畦間処理)  
(草丈20cm以下)・3回以内  
効果が早く表れる即効性で、抑制期間  
も長い除草剤です。



地上部のみ  
枯らす

## カテキンパワー 1,000倍

茶葉から抽出した植物活力資材  
これからの時期お勧めです！  
どぶ漬け時もしくは葉面散布に  
ご使用ください。



◎ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避けてください。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避けてください。