



# ミニトマト編



病害虫注意報  
2017年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 黄化葉巻病(TYLCV)特集



芽先が黄化・葉巻症状になり、節間がつまる。



タバココナジラミ幼虫



タバココナジラミ成虫

暖かくなると天窓の開閉が多くなり、コナジラミ類の飛び込みが増えます。コナジラミによる黄化葉巻病の発生が多くなる時期ですので注意しましょう！

発病株全体にウイルスが広がっています。芽先をピンチするだけでは新たな保毒虫が増えるため、被害が拡大します！

**黄化葉巻病感染株は株ごと早急に除去しましょう！！**

★タバココナジラミ(バイタイプB,Q)によって媒介されるのでコナジラミ類の防除を徹底しましょう！

## 今月のおすすめコナジラミ類・灰色かび病 防除ローテーション

薬害回避のために、高温時・多湿時の散布は控え、夕方までにきちんと乾かしましょう！

コナジラミ類 アザミマ類 ハメグリハエ類 ハシモンヨトウ オタバコガ	ディアナSC 2,500~5,000倍 前日/2回 1日 ※コナジラミ類は2,500倍
灰色かび病	【予】セイビアーフロアブル20 1,000~1,500倍 前日/3回

タバココナジラミ類 (シルバーコナジラミを含む) トマトヒゲダニ	ダニトロンフロアブル 1,000~2,000倍 前日/3回 1日 ※トマトヒゲダニは1,000倍
灰色かび病 葉かび病	【予】ベルコート水和剤 6,000倍 前日/2回

コナジラミ類 アザミマ類 アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍 前日/3回 1日
菌核病 葉かび病 灰色かび病	【予・治】ゲッター水和剤 1,500倍 前日/3回

### おすすめ薬剤

## フーモン



有効成分がすばやく害虫を包圍し、気門封鎖で窒息死させます！

【登録内容】  
アブラムシ類、ハダニ類  
コナジラミ類、うどんこ病  
1,000倍/収穫前日  
回数制限なし

### 今月のおすすめ資材

## ファイトマジック



キレートマグネシウム  
+各種微量元素  
**1,000倍/葉面散布**  
◆葉と根の充実  
◆葉の伸・テリ・厚み向上  
肥料登録:生第87201号

## 1価リン酸カリ液

亜リン酸カリ肥料 0-29-19  
**1,000~2,000倍 葉面散布**  
**0.5~1L/10a/回 灌注**  
※週1回の灌注がお勧め  
◆リン酸吸収UP  
◆花芽の充実  
肥料登録:輸第13355号

