



スイートコーン編



病害虫注意報
2017年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春先はアブラムシやチョウ目害虫の発生に注意しましょう！

気温が温かくなるにしたがって、アブラムシやチョウ目害虫の活動が活発になります。
虫による被害を減らすために、数が増えないようにしっかり防除して下さい。

※スイートコーンとヤングコーンは登録内容が異なります。
使用前に必ずラベルをご確認ください。

＜アブラムシ類の主な防除薬＞

薬剤名	希釈倍率	日数/回数	適用病害虫	ヤングコーンでの使用
アグロスリン乳剤	1000～2000倍	7日前/3回	アブラムシ類(2000倍)、アヲメカ、アヲトウ(1000倍)	×
アクタラ顆粒水溶剤	3000倍	7日前/2回	アブラムシ類	×
アドマイヤーフロアブル	4000倍	14日前/2回	アブラムシ類	○ 3日前/2回
モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	前日/3回	アブラムシ類	○ 前日/2回 2000倍

＜チョウ目害虫の主な防除薬＞

薬剤名	希釈倍率	日数/回数	適用病害虫	ヤングコーンでの使用
アニキ乳剤	1000倍	前日/3回	材バカ	○ 前日/3回
アフーム乳剤	1000～2000倍	3日前/2回	材バカ、トウムシ	○ 前日/2回
カスケード乳剤	2000～4000倍	7日前/2回	アヲメカ、材バカ(4000倍)	×
コテツフロアブル	2000倍	前日/2回	材バカ、ハダニ類	○ 前日/2回
ゼンターリ顆粒水和剤	1000倍	前日/-	材バカ	○ 前日/- (野菜類登録)
プレバソソフロアブル5	2000倍	前日/3回	アヲメカ、材バカ	×
フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	前日/2回	アヲメカ、材バカ	○ 前日/2回
プレオフロアブル	1000倍	前日/2回	材バカ	×
粒剤 パダン粒剤4	6kg/10a 株の上から均一に撒粒する。	7日前/2回	アヲメカ	×

登録内容再度確認

とうもろこしは種類によって農薬使用基準が異なります！

スイートコーン
とうもろこし登録もしくは
未成熟とうもろこし登録

ヤングコーン・ベビーコーン
ヤングコーン登録もしくは
野菜類登録

スイートコーンの収穫前にヤングコーンを収穫する場合は、必ずどちらにも登録されている薬剤を使用して下さい。

※スイートコーンの農薬使用回数には、ヤングコーンで使用した回数を含めて下さい。

おすすめ資材

リニューアル
しました!

ファイトカル

優れた展着性と浸透性

トレハロースや有機酸に加え、新配合のグリシンベタインでカルシウムがキレート化され、浸透性や移動性が向上しています！

