



ナス編



病害虫注意報
2017年8月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

育苗期・定植時の防除特集

アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類の発生に注意しましょう！

また、育苗期にすすかび病が少しでも発生すると、本圃で多発する傾向があるので注意しましょう！

【おすすめ粒剤・灌注剤】

	薬剤名	使用量/倍率	使用時期	使用回数	ハチ影響日数	コナジラミ類	アブラムシ類	その他
粒剤	ベストガード粒剤	1~2g/株	育苗期・定植時	育苗期及び定植時合わせて1回	30日以上	○ (育苗期 1g)	○ (育苗期 1g)	ミナキイロアザミウマ
	アルバリン粒剤	1~2g/株	育苗期・定植時	育苗期及び定植時合わせて1回	40日 (影響日数変更)	○	○ (1g/株)	アザミウマ類・ハモグリハエ類
	プリロツソ粒剤	2g/株	育苗期後半~定植時	合わせて1回 ※	1日	○	○	アザミウマ類・ハモグリハエ類
灌注	灌注専用剤 ベリマークSC	400倍(25ml/株)、800倍(50ml/株)	育苗期後半~定植当日		1日	○	○	アザミウマ類・ハモグリハエ類・ネキリムシ類

※プリロツソ粒剤とベリマークSCは同一成分のため、合計1回までの使用です。

おすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	回数	影響日数		その他
					ミツバチ	マルハナ	
8月①	ミナキイロアザミウマ・ハダニ類・ミナキイロアザミウマ・オオタバコガ・チャノホコリダニ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・テントウムシダマシ類	コテツフロアブル	2000倍	前日/4回	10日	9日	4葉期以降の使用
	菌核病・黒枯病・灰色かび病	ゲッター水和剤 予・治	1000倍~1500倍	前日/5回	0日	1日	黒枯病 1500倍
8月②	チャノホコリダニ・コナジラミ類・ハモグリハエ類・オオタバコガ・ハスモンヨトウ	アニキ乳剤	1000倍~2000倍	前日/3回	1日	1日	
	すすかび病・うどんこ病・灰色かび病	ベルクート水和剤 予	3000倍	前日/3回	0日	0日	
8月③	アブラムシ類・コナジラミ類・ミナキイロアザミウマ	ベストガード水溶剤	1000倍~2000倍	前日/3回	6日	10日以上	
	すすかび病 うどんこ病	トリフミン水和剤 予・治	3000倍~5000倍	前日/5回	0日	1日	すすかび病 3000倍
8月④	ハモグリハエ類・ハスモンヨトウ・オオタバコガ	プレバソンフロアブル5	1000倍~2000倍	前日/2回	1日	1日	ハスモンヨトウ オオタバコガ 2000倍
	すすかび病・うどんこ病・黒枯病・灰色かび病	ダコニール1000 予	1000倍	前日/4回	0日	0日	