



レタス編



病害虫注意報
2017年9月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

☆育苗～定植時のおすすめ粒剤・灌注剤

薬剤名	使用量・方法	時期	回数	適用病害虫	非結球レタスの登録
細菌性病害対策 オリゼメート粒剤	6～9kg/10a・土壌混和	定植時	1回	斑点細菌病・腐敗病	非結球
アブラムシ類対策 ベストガード粒剤	50g/セルトレイ (上から均一散布)	育苗期後半	併せて 1回	アブラムシ類	なし
	0.5～1g/株・株元処理	育苗期後半		ナモグリハエ	なし
	10g/培土L・育苗培土混和	は種時		ナモグリハエ	なし
アクタラ粒剤5	0.5g/株・株元散布	育苗期後半	1回	アブラムシ類・ナモグリハエ	非結球
チョロ目対策 プレバソンフロアブル5	100倍・セルトレイ0.5L灌注	育苗期後半～定植当日	1回	ハモグリハエ類・オオタバコガ・ヨウムシ・ヒメフタテンヨコバイ・ハスモンヨトウ・ネキリムシ類	非結球
アブラムシ類・チョロ目対策 ベリマークSC	400倍・セルトレイ0.5L灌注	育苗期後半～定植当日	1回	アブラムシ類・ハモグリハエ類・オオタバコガ・ヒメフタテンヨコバイ・ハスモンヨトウ	非結球

★育苗期の病害虫対策

薬剤名	使用量・方法	時期	回数	適用病害虫	非結球レタスの登録
ダコニール1000	1000倍・散布	収穫14日前	3回	すそ枯病・べと病	リーフ
アディオソ乳剤	2000～3000倍・散布	収穫7日前	5回	アブラムシ類・ヨウムシ	リーフ
スピノエース顆粒水和剤	2500～5000倍・散布	収穫3日前	3回	オオタバコガ・ヨウムシ(5000倍)	非結球
	500～1000倍・セルトレイ0.5L灌注	定植前	1回	ハモグリハエ類	
アフファーム乳剤	1000～2000倍・散布	収穫3日前	3回	ナモグリハエ・オオタバコガ・ハスモンヨトウ	非結球

注：非結球レタス類は登録内容をご確認後、使用して下さい。

育苗期の問題解決



根張りの改善!

毛細根を充実させて丈夫な苗に!



葉面散布

ペンタキープHyper (7000倍)
ファイトオーゾー (1000倍)

・曇天が続いた後
・苗が徒長した時
・定植の5日前

高温による葉焼け!

カルシウム補給で葉焼け防止!

・急な日射時
・急な高温時
・展着剤の代わりに



葉面散布
ファイトカル (1000倍)

亜リン酸だから速効性!

エレマックス赤

N-P-K=0-28-26

肥料登録：輸第9423号

おすすめ使用方法

・育苗期 定植7日前に葉面散布1,000倍で使用しましょう!

植物の病害抵抗性を向上



注意!! 農薬登録変更情報

ランネット45DF

- ・「レタス」の使用時期が「収穫7日前まで」から「**収穫21日前まで**」に変更
- ・「サラダ菜」の使用時期が「収穫14日前まで」から「**収穫21日前まで**」に変更

オルトラン水和剤

- ・「非結球レタス」の使用時期が「収穫21日前まで」から「**収穫30日前まで**」に変更

★「レタス」は変更ありません。

ラベル主義に基づきますが、変更の周知をお願いします。