



# キク編



病害虫注意報  
2017年11月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 白さび病・ハダニ類発生注意！

夜間、ハウスを閉め切る季節になりました。閉めきったハウス内は湿度が高くなり、白さび病発生の原因となります。循環扇や暖房機の送風で空気を動かしたり、モヤコンなどで暖房機を強制的に稼働させ湿度を下げましょう。引き続き、ハダニ、アブラムシ、ハモグリバエ等の初期発生を見逃さない様にして下さい。

### 今月のおすすめ ローテーション

※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては被害が発生する場合がありますためご注意ください。展着剤、葉面散布剤などを加用する場合もご注意ください。

生育  
初期

白さび病	Inochio オペラフラワー乳剤	2,000倍 発病初期/3回
白さび病 アブラムシ類 アザミヤカ類 ハダニ類	ハチハチ乳剤	1,000倍 発病・発生初期/4回



破蕾  
期

消灯時

白さび病 うどんこ病	アンピル フロアブル	1,000倍 発病初期/7回	白さび病、 灰色かび病	アフエツフロアブル	2,000倍 発病初期/3回
ハダニ類	スターマイト フロアブル	2,000倍 発生初期/1回	ハダニ類	ペンタック水和剤	1,000倍 —/—
アブラムシ類	ウララ50DF	5,000~10,000倍 発生初期/6回	ミナトアザミヤカ ハダニ類	カスケード乳剤	2,000倍 —/3回

発蕾  
期

白さび病 うどんこ病 アブラムシ類	ピリカット乳剤	1,000~2,000倍/発生・発病初期/6回 (白さび病・アブラムシ類は1,000倍、 うどんこ病は2,000倍)
アブラムシ類 アザミヤカ類 ハダニ類 カメムシ類	ダントツ水溶剤	2,000~4,000倍 発生初期/4回 *アブラムシ類は花き類・観葉植物での登録

### 閉め切ったら循環扇の活用を！



閉め切った施設内は空気が滞りやすく、作物の周りは湿度が高い状態になります。白さび病の発生を予防するために、循環扇により空気を動かしてください。

### 置らくじゃん

暖房機の準備の時に吹出口に  
設置しましょう！

芳香性環境保護液

(成分: 桂皮油、ユーカリ油)

- 人体、環境に安全な天然成分
- 2~4個/10a



散布用  
「おきらくじゃん103」  
もオススメ！