



レタス編



病害虫注意報
2017年11月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

病害に注意しましょう！

雨が降ったり曇天が続くと発生が多くなるので
雨前後にはしっかり防除しましょう！

すそ枯病

- 原因菌：リゾクトニア菌
- やや低温で雨が多く、
土壌湿度が高いと多発する。
中耕時の土の掛かりに注意！

斑点細菌病

- 原因菌：バクテリア（細菌）
- 菌は土壌中に存在する
風や雨、作業などで植物体上に
運ばれた時に発病する。
気温がやや低く、雨の多い時多発。



薬剤名	使用倍率	使用時期／使用回数	適用病害	非結球レタス登録の有無
アフエットフロアブル	2000倍	前日/3回	すそ枯病、菌核病、灰色かび病	非結球
リゾレックス水和剤	1000倍	7日/3回	すそ枯病	なし
バリダシン液剤5	800倍	7日/3回	すそ枯病、軟腐病、腐敗病	非結球
銅パーシ水水和剤	1000倍	7日/4回	斑点細菌病、腐敗病	非結球
日数注意 ダコニール1000	1000倍	14日/3回	すそ枯病、べと病	リーフ
日数注意 トップジンM水和剤	1500～2000倍	7日/2回	菌核病、灰色かび病：1500～2000倍 すそ枯病：1500倍	非結球
日数注意 ナレート水和剤	1000倍	21日/2回	腐敗病、斑点細菌病、軟腐病	なし
日数注意 キノンドー水和剤40	600～800倍	21日/5回	軟腐病、べと病、斑点細菌病：600倍 腐敗病：600～800倍	なし

有機銅の
総使用回数
5回以内

注：非結球レタス類は登録内容をご確認後、使用して下さい。

おすすめ資材

萎れ・草勢低下予防！

- ファイトオーツ：外葉の充実・結球不良防止！
光合成量増加、毛細根の充実！！
（肥料登録：生第83241号）
- ファイトカル：カルシウム補給で葉焼け予防！
展着剤の代わりに！
チップバーン、乾燥の予防！
（肥料登録：生第83188号）



光合成促進・耐病性向上！



エリマックス赤

亜りん酸配合
N-P-K=0-28-26

吸収されやすい亜
りん酸、水溶性加
里配合で品質の向
上に！！

葉面散布
エリマックス赤
(1000倍)

（肥料登録：
輸第9423号）

石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、
液肥、ホルモン剤との混用は避けてください。

降雨後の樹勢回復！

カテキンパワー：カテキンの効果で腐り防止！

雨が続いたとき、風で植物体が傷ついた
ときの樹勢回復に！（キノンドー、銅パーシ、トッ
ジンMと混用不可）（肥料登録：生第91402号）



葉面散布
カテキンパワー (1000倍)