



# ブロッコリー編



病害虫注意報  
2017年12月作成

※農薬はラベルの記載に従って使用してください

## 黒すす病・花蕾腐敗病特集

### 黒すす病



葉の症状



花蕾の症状

症状

花蕾や葉の黒変、黒褐色のかび発生

多発条件

被害株の放置、連続した風雨

### 花蕾腐敗病



花蕾の症状



症状

花蕾の水浸状腐敗、悪臭

多発条件

土壌の過湿、株の窒素過多

## 黒すす病・花蕾腐敗病防除ローテーション

※菌核病防除の時期でもありますので、同時防除薬剤を組み合わせる表記しています

菌核病  
べと病

### シグナムWDG

1,500倍 (収穫14日前まで/1回)

べと病には1,500~2,000倍



菌核病

### アフエットフロアブル

2,000倍 (収穫前日まで/3回以内)

軟腐病  
黒斑細菌病

### スターナ水和剤

2,000倍 (収穫14日前まで/2回以内)

黒すす病  
べと病

### アミスター20フロアブル

2,000倍 (収穫3日前まで/3回以内)

降雨直後など多湿条件下での散布は避ける。展着剤注意



※花蕾腐敗病には、Zボルドー500倍(一/一)の散布もお勧めです  
花蕾形成期までに散布してください(薬害回避)

## 病気に負けない株作りに！

### カテキンパワー

1000倍

肥料登録:生第91402号

農薬散布時の混用がおすすめ！



混用不可: ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、微生物由来農薬、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料

## 登録変更情報

### 八子八子乳剤

2017年10月25日登録変更

登録変更内容

「収穫3日前まで」→「収穫7日前まで」

ラベル主義に基づきますが、変更の周知をお願いします