



キャベツ編



病害虫注意報
2018年1月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



病害対策

今作では病害が多くなっています。
発病前の予防防除や降雨前後の防除を徹底しましょう！

かびによる病害

菌核病 (Sclerotinia菌)

株腐病 (Thanatephorus菌)



今作
多発して
います！

- ・地際から軟化腐敗をするが悪臭はない。
- ・白いカビが地際を覆う。症状が進むとネズミの糞状の菌核が形成される。

- ・結球下部に黒褐色の病斑が生じ、やがて結球全面に広がり、腐敗症状となる。
- ・腐敗は表層にとどまり、内部には進行しない。

【おもな薬剤】

ファンタジスタ顆粒水和剤 2,000～3,000倍/14日前/3回
スクレアフロアブル 2,000倍/前日/3回

【おもな薬剤】

リゾレックス水和剤 500～1,000倍/7日前/3回
ハリダシン液剤5 800倍/7日前/5回

【菌核病・株腐病の両方に登録のある薬剤】

カンタストライフフロアブル 1,500倍/7日前/2回※
セイビアーフロアブル20 1,000倍/3日前/3回
ロブール水和剤 1,000倍/7日前/4回

シグナムWDG 1,500倍/7日前/2回※
アフェットフロアブル 2,000倍/前日/3回

※使用回数に注意!!! カンタストとシグナムは併せて2回です。

細菌による病害

(昨年度に引き続き多発しています！)

黒腐病 (Xanthomonas菌)



- ・葉縁部からV字型の黄色病斑が広がる。
- ・菌は雨滴で葉に付着し、水孔や傷がついた部分から侵入し、導管を伝って広がる。

【おもな薬剤】

ハリダシン液剤5 800倍/7日前/5回
アグリマイシン-100 2,000倍/14日前/2回
カッパーシン水和剤 **注!!** 1,000倍/7日前/4回

注) 結球期以降は薬害に注意！

適用拡大情報☆

オルフィンフロアブル

10月25日
登録拡大！

- ・菌核病
- ・2,000～3,000倍
- ・新規系統薬剤！
- ・浸達性、浸透移行性に優れている。
- ・耐雨性が高く汚れも少ない！
- ・収穫7日前まで/1回
- ・100～300L/10a



モベントフロアブル

11月22日
登録拡大！

- ・アブラムシ類、アザミウマ類
- ・2,000～4,000倍(アザミウマ類は2,000倍)
- ・100～300L/10a
- ・優れた浸透移行性！
- ・1剤で幅広い吸汁性害虫に優れた効果。
- ・収穫7日前まで/3回



◆◆ 新年のご挨拶 ◆◆

あけましておめでとうございます。

本年も皆様の作物の健康をお守りするため、
病害虫や農業に関する情報をお届けします。
今後ともよろしく願い致します。

