



レタス編



病害虫注意報
2018年1月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

病害に注意!

べと病

Bremia lactucae

- 地際の外葉表面に黄色・不定形の斑点ができ、葉裏に霜状のかびを生じる
- 低温期の多雨で発生する
- 組織内で菌糸または卵胞子の形で越冬する

灰色かび病

Botrytis cinerea

- 外葉基部や凍寒害による傷から菌が入りやすい
- 外葉の葉柄・葉身に水浸状の病斑ができ、灰色のビロード状のかびを生じる
- 低温多湿で発生する
- 被害残差とともに菌糸で土中に越冬する

菌核病

Sclerotinia sclerotiorum

- 褐色水浸状の病斑ができ、株元から腐敗し始めて株全体が軟腐する
- ネズミの糞状の菌核を形成して土壤中で数年生存する。
- 多湿条件で多発する

《べと病・灰色かび病・菌核病のおすすめ薬剤》 注：非結球レタス類は登録内容をご確認後、使用して下さい。

薬剤名	効果	使用量・方法	時期・回数	適用病害	非結球レタスの登録有無【注】
アフエットフロアブル	予防	2,000倍	前日・3回	灰色かび病・菌核病・すそ枯病	非結球有
ファンタジスタ 顆粒水和剤	予・治	2,000～3,000倍	3日前・3回 (非結球は14日前)	灰色かび病・菌核病	非結球有
アミスター20 フロアブル	予・治	2,000倍	7日前・4回	べと病・灰色かび病・菌核病・すそ枯病	非結球有 ※すそ枯病適用無
トップジンM水和剤	予・治	1,500～2,000倍 (すそ枯病は1,500倍)	7日前・2回 (非結球は21日前)	灰色かび病・菌核病・すそ枯病	非結球有 ※すそ枯病適用無
シグナムWDG	予・治	1,500～2,000倍 (べと病以外は1,500倍)	14日前・併せて1回	べと病・灰色かび病・菌核病・すそ枯病	非結球有
カンタス ドライフロアブル	予・治	1,000～1,500倍		灰色かび病・菌核病	非結球有
新剤 ピシロックフロアブル	予防	1,000倍	前日・3回	べと病	非結球有

今年の冬は晴天が続く予報です
乾燥する時期に
プラス

生第83188号



ファイトカル 1000倍

展着剤代わりに！（優れた展着性と浸透性）
チップバーン予防！（素早くカルシウムを補給）
凍寒害から植物を守る！（トレハロース配合）

注意!!

農薬登録変更情報

ウララDF

「非結球レタス」使用時期が
「収穫前日」から
「収穫3日前まで」に変更

アクセルフロアブル

「非結球レタス」使用時期が
「収穫7日前まで」から
「収穫前日まで」に変更

※ラベル主義に基づきますが、変更の周知をお願いします。

新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。
本年も皆様の作物の健康をお守りするため、
病害虫や農業に関する情報をお届けします。
今後ともよろしくお願ひ致します。

