



イチゴ編

inochio
GROUP

病害虫注意報
2018年3月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫等で忙しい時期ではありますが 定期的な防除を心掛けていきましょう！

収穫中 おすすめローテーション④

時期	対象 病害虫	薬剤名	倍率	使用 時期	回数	影響日数			
						ミツ バチ	マルハ バチ	ミカ ク	刊
3月 ①	うどんこ病 灰色かび病	ネクスターフロアブル	1,000倍	前日	3回	翌日	翌日		0日
	ハダニ類	ダニサラバ フロアブル	1,000倍	前日	2回		1日		0日
3月 ②	灰色かび病 菌核病・黒斑病	ロブラール水和剤	1,500倍	前日	4回		1日		0日
	アブラムシ類 アザミマ類 コナジラミ類 ハモトウ	ベネビアOD ※ 展着剤加用不可	2,000~ 4,000倍	前日	3回		1日		0日
3月 ③	灰色かび病	カンタスドライ フロアブル	1,000~ 1,500	前日	3回		0日		0日
	ハダニ類・アブラムシ類 コナジラミ類 うどんこ病	フーモン	1,000倍	前日	-		1日		1日

天敵注意

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控え、その日のうちにきちんと乾かしましょう！

おすすめ資材

アブラムシ類の対策に 天敵を！

アフィパール

- ◆ 成分：コレマンアブラバチ 500頭入
- ◆ 対象害虫：アブラムシ類
- ◆ 対象作物：野菜類（施設栽培）
- ◆ 使用時期：発生初期
- ◆ 使用方法：1~2瓶/10a・放飼

※ アフィパールの増殖を促すために、バンカープラント「アフィバンク」を使用しましょう！

軟果の防止に 液体のカルシウム肥料！

セルサイエンスCa

- ◆ 主成分：キレートカルシウム
- ◆ 効果：果実の品質向上、チップバーン対策
- ◆ 使用方法：土壌灌注 1,000~1,500倍(1~3L/10a)

ハウス温度の上昇を抑える遮光剤！

Q4ホホワイト

- ◆ ハウス内を涼しく、人と作物に快適な環境にします。
- ◆ 粒子が細かく、優れた耐候性
- ◆ 15L (20kg) / 缶
- ※ 散布後は、遮光剤が乾く前に器具の洗浄をしっかりと行ってください。



飼料量と遮光率の目安
(150L/10a散布の場合)

使用量	遮光率
1.3缶	約45%
1缶	約40%
0.8缶	約30%
0.5缶	約20%

