



# トマト編



病害虫注意報  
2018年4月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## トマトサビダニ特集 **このような症状に注意!**

極めて微小で、目には見えない害虫です。気象条件も良く、生育が旺盛になり作業管理に追われるこの時期によく目にします。発生に注意して予防散布を心がけていきましょう!



温度	発育日数(日)		
	卵	幼虫~若虫	合計
15℃	8.3	8.8	17.1
25℃	3.1	2.4	<b>5.5</b>
30℃	2.2	2.4	<b>4.6</b>

たった5日で卵~成虫に!

25℃では、卵の比率は約7割で、約25日の寿命中に1羽あたり約50卵産みます!

## 今月のおすすめ 防除ローテーション

コナジラミ類 トマトサビダニ  
ミカンカイガサミダリ ハダニ類  
ハモシトウ オオバコガ

マツチ乳剤 1,000~3,000倍 前日/4回 1回/1日  
※総使用回数に注意!  
※コナジラミ類・トマトサビダニは2,000倍、ハダニ類は1,000倍  
ミカンカイガサミダリは1,000~2,000倍、ハモシトウは3,000倍  
オオバコガは2,000~3,000倍

コナジラミ類  
トマトサビダニ  
ハダニ類

コロマイト乳剤 1,500倍 前日/2回 1回/1日

トマトサビダニ  
ハダニ類

マイトコーネフロアブル  
1,000倍 前日/1回 1回/1日

トマトサビダニ  
コナジラミ類

アプロードエースフロアブル 1,000~2,000倍 前日/3回 1回/1日  
※トマトサビダニは1,000倍  
ミト使用不可

暖かくなり、コナジラミ類等の害虫の活動も活発になります。早めの対策を行っていきましょう!

### 登録内容変更情報

#### ダニトロンフロアブル

※使用時期変更!

使用時期/収穫前日まで

↓  
収穫開始14日前まで

ご注意ください!

先月に引き続き!

光合成能力UP! 葉焼け・尻腐れ対策に!

#### ペンタキープHyper



新成分アルギニン配合でさらに吸肥力UP!

5,000倍 葉面散布

おすすめは、2週間おき3回以上!

#### ファイトカル

Wキレート化でカルシウム  
の吸収性を向上!

展着剤代わりに!



1,000倍 葉面散布

おすすめは、10日~14日おき!