



# ミニトマト編



病害虫注意報  
2018年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 黄化葉巻病(TYLCV)特集



芽先が黄化・葉巻症状になり、  
節間がつまる。



タバココナジラミ幼虫



タバココナジラミ成虫

暖かくなると天窓の開閉が多くなり、  
コナジラミ類の飛び込みが増えます。  
コナジラミによる黄化葉巻病の発生が  
多くなる時期ですので注意しましょう！

発病株全体にウイルスが広がっています。  
芽先をピンチするだけでは新たな保毒虫が  
増えるため、被害が拡大します！

**黄化葉巻病感染株は株ごと  
早急に除去しましょう！！**

★タバココナジラミ(バイotype B,Q)によって媒介されるのでコナジラミ類の防除を徹底しましょう！

## 今月のおすすめコナジラミ類・灰色かび病 防除ローテーション

薬害回避のために、高温時・多湿時の散布は控え、夕方までにきちんと乾かしましょう！

コナジラミ類 アザミマ類 ハダカバエ類 ハモトウ オタバコガ	ディアナSC 2,500~5,000倍 前日/2回 1日 ※コナジラミ類は2,500倍
灰色かび病	【予】セイビアーフロアブル20 1,000~1,500倍/散布 前日/3回

コナジラミ類 トマトヒゲニ ミカンキロアザミマ ハモトウ ハダカバエ類 オタバコガ	アニキ乳剤 1,000~2,000倍 前日/3回 1日 ※トマトヒゲニ、ハダカバエ類、ハモトウ、 オタバコガは2,000倍
葉かび病・菌核病 灰色かび病	【予・治】カンタストライフロアブル 1,000~1,500倍 (前日/3回)

コナジラミ類 アザミマ類 アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍/散布 前日/3回 1日
菌核病 葉かび病 灰色かび病	【予・治】ゲッター水和剤 1,500倍/散布 前日/3回 1日 ※総使用回数に注意！

### おすすめ薬剤

## フーモン



有効成分がすばやく害虫を  
包圍し、気門封鎖で窒息死  
させます！

【登録内容】  
野菜類登録

アブラムシ類、ハダニ類  
コナジラミ類、うどんこ病  
1,000倍/収穫前日  
回数制限なし



### 適用拡大情報

2018年3月30日  
適用拡大！

## アクセルフロアブル

◆新しい化学構造の殺虫剤  
◆既存剤抵抗性害虫にも有効！

【登録内容】  
オタバコガ、ハモトウ  
1,000~2,000倍  
100~300L/10a散布  
収穫前日/3回

マルハナバチ影響日数8日



## ガッテン乳剤

◆新規構造・新規作用  
◆残効性にも優れる！

【登録内容】  
うどんこ病  
5,000倍  
100~300L/10a散布  
収穫前日/2回

