



キク編



病害虫注意報
2018年6月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

白さび病・害虫注意！ 5月に引き続き、白さび病の発生しやすい季節です。循環扇、モヤコン等を活用して空気の対流と湿度を下げる環境づくりを徹底していきましょう！また気温の上昇に伴いアザミウマ、ハモグリバエ等の害虫の発生も増加します。悪天候が続く時期ですので、晴れの日には薬剤散布ができるよう天気予報に注意しながらしっかり予防を行いきましょう！



今月のおすすめローテーション

生育初期	さび病、炭疽病 灰色かび病、べと病	エムダイファー水和剤	400～650倍 発病初期/8回
	アブラムシ類、コナジラミ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍 発生初期/4回
	アブラムシ類	アーデントフロアブル	2,000倍 発生初期/5回

破蕾期	アブラムシ類 アザミウマ類	モスピラン 顆粒水溶剤	アザミウマ類2,000倍 アブラムシ類4,000倍 発生初期/5回	消灯時	アブラムシ類 コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	ベストガード 水溶剤	1,000～2,000倍 ※コナジラミ類、ミカンキイロアザミウマは1,000倍 発生初期/4回
	ハダニ類	カネマイト フロアブル	1,000～1,500倍 -/1回		ハダニ類 ハモグリバエ類	コロマイト乳剤	1,500倍 -/2回
	白さび病 うどんこ病 アブラムシ類	ピリカット 乳剤	白さび病、アブラムシ類は 1,000倍 うどんこ病2,000倍 発病・発生初期/6回		白さび病 うどんこ病	アンビル フロアブル	1,000倍 発病初期/7回

発蕾期	アザミウマ類、コナジラミ類 ハモグリバエ類、オオハコガ	ディアナSC	2,500～5,000倍 ※コナジラミ類は2,500倍 発生初期/2回
	白さび病	Inochio オペラフラワー乳剤	2,000倍 発病初期/3回

※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますためご注意ください。展着剤、葉面散布剤などを加用する場合もご注意ください。

葉やけ・芽やけ対策に！

オランダ生まれ吹付式 白色遮光剤

Q4ホワイト

使用量目安：1缶～/反

※1缶/反使用で遮光率約36%

詳しくは営業担当までご連絡ください



15L (20kg)/缶

白さび病発生時
おすすめ薬剤

アミスター-20フロアブル

2,000倍 発病初期/5回

※混用、使用時期に注意！