レタス編

inochio GROUP

病害虫注意報
2018年11月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

病害に注意しましょう！

雨が降ったり曇天が続くと発生が多くなるので
雨前後にはしっかり防除しましょう！

すそ枯病

●原因菌：リゾクトニア菌
●やや低温で雨が多く、
土壌湿度が高いと多発する。
中耕時の土の掛かりに注意！

斑点細菌病

●原因菌：バクテリア（細菌）
●菌は土壌中に存在する。
風や雨、作業などで植物体上に
運ばれた時に発病する。
気温がやや低く、雨の多い時多発。

薬剤名	使用倍率	使用時期／使用回数	適用病害	非結球レタス登録
アフェットフロアブル	2000倍	前日/3回	すそ枯病、菌核病、灰色かび病	非結球
リゾレックス水和剤	1000倍	7日/3回	すそ枯病、白絹病	なし
バリダシン液剤5	800倍	7日/3回	すそ枯病、軟腐病、腐敗病	非結球
カッパーシン水和剤	1000倍	7日/4回	斑点細菌病、腐敗病	非結球
ダコニール1000	1000倍	14日/3回	すそ枯病、べと病、灰色かび病	リーフ（すそ枯病、べと病）
トップジンM水和剤	1500～2000倍	7日/2回	菌核病、灰色かび病：1500～2000倍 すそ枯病：1500倍	非結球（菌核病、灰色かび病）
ネクスターフロアブル	1000倍	前日/3回	菌核病、すそ枯病、灰色かび病	なし
ロブラール水和剤	1000倍～1500倍	14日/3回	灰色かび病 菌核病、すそ枯病：1000倍	なし

注：非結球レタス類は登録内容をご確認後、使用して下さい。

おすすめ資材

萎れ・草勢低下予防！

ファイトオーツー：外葉の充実・結球不良防止！
光合成量増加、毛細根の充実！！
（肥料登録：生第83241号）

ファイトカル：カルシウム補給で葉焼け予防！
展着剤の代わりに！
チップバーン、乾燥の予防！
（肥料登録：生第83188号）

葉面散布
ファイトオーツー（1000倍）
＋ ファイトカル（1000倍）

降雨後の樹勢回復！

葉面散布
カテキンパワー（1000倍）

カテキンパワー：カテキンの効果で腐り防止！
雨が続いたとき、風で植物体が傷ついたときの樹勢回復に！（キノンドー、カッパーシン、トップジン、バリダシンと混用不可）　肥料登録：生第91402号

光合成促進・耐病性向上！

葉面散布
エレマックス赤
（1000倍）

エレマックス赤

亜りん酸配合
N-P-K＝0-28-26

吸収されやすい亜リン酸、水溶性加里配合で品質の向上に！！

（肥料登録：輸第9423号）

石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください。