



# イチゴ編



病害虫注意報  
2019年1月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春先の病害虫蔓延を防ぐために 定期的な防除を心掛けましょう！

## 収穫中 おすすめローテーション②

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハナバチ	ミカ	刊
1月①	うどんこ病 灰色かび病	カクグリーン ※野菜類登録	800~ 1,000倍 ※ 灰色かび病は800倍	前日	—	0日		0日	
	ハダニ類・コナジラミ類 チャホリダニ うどんこ病	サフオイル乳剤	300~ 500倍 ※ハダニ類以外は300倍	前日	—	1日		1日	天敵注意
1月②	うどんこ病 灰色かび病	オルフィン フロアブル	2,000~ 3,000倍	前日	1回	1日		—	
	ハダニ類	ダニサラバ フロアブル	1,000倍	前日	2回	1日		0日	
1月③	うどんこ病	セナーデ水和剤 汚れ注意	2,000倍	発病前~ 発病初期	—	0日		—	
	ハダニ類・アブラムシ類 コナジラミ類 うどんこ病	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	—	1日		1日	天敵注意

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

### おすすめ資材

イチゴのうどんこ病追加!  
(12/5付)

紅花由来の気門封鎖剤・殺虫剤

## サフオイル乳剤

- ◆ 対象病害虫：ハダニ類、コナジラミ類、チャホリダニ、うどんこ病
- ◆ 300~500倍/前日/-回
- ◆ 殺卵活性も認められます
- ◆ 展着剤の混用をオススメします

連続出蕾による成り疲れの対策に！



## ファイトオーツ

- ◆ 葉面散布1,000倍
- ◆ 農薬・肥料との混用可能

肥料登録：生第83241号

根張りの弱くなる冬季・収穫期にも  
新しい根を出すチカラを！



## ファイトメット

- ◆ 灌注処理100~150g/10a
- ◆ 10~14日おきに3~4回

肥料登録：生第84050号

### 新年の御挨拶

あけましておめでとうございます。本年も皆様の作物の健康をお守りするため、病害虫等に関する情報をお届け致します。本年もどうぞよろしくお願ひ致します。

