



# トマト編



病害虫注意報  
2019年1月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 疫病特集

疫病は一旦発病すると感染拡大が早いので注意しましょう！



**症状：**葉、茎、果実に発生する。初め灰緑色水浸状で、次第に暗褐色大型病斑になる。多湿時には、表面に白色のかびを生ずる

**発病条件：**やや低温で、湿度が高い時(曇雨天時)など

**注意点：**

- ・感染～発病が短く、発病条件がそろると**短期間で大発生する！**
- ・**発生初期は灰色かび病と間違えやすい！**
- ※薬剤が全く違うので、病気の判断と剤の選択は慎重に

### 対策

- 被害株の除去
  - 排水性の改善
  - 施設内の換気、暖房機運転
  - 薬剤散布
- など

【予】 レバフロアブル1,500~2,000倍 (前日/3回)

【予】 ライメイフロアブル 2,000~4,000倍 (前日/4回)

※病害発生前から予防的に対策を行いましょう！

## 今月のおすすめローテーション

※今月は疫病、灰色かび病、葉かび病、すすかび病に注意しましょう！  
※コナジラミは発生の少ないうちに確実に防除しましょう！

葉かび病・灰色かび病・菌核病 ・すすかび病・うどんこ病	<b>アフエットフロアブル</b> 【予】 2,000倍 (前日/3回) ※うどんこ病は2,000~4,000倍
コナジラミ類・アブラムシ類	<b>バリアード顆粒水和剤</b> 2,000~4,000倍 (前日/3回) ※1日

灰色かび病 菌核病	<b>ピクシオDF</b> 【予・治】 2,000倍(前日/4回)
コナジラミ類・アブラムシ類 ハダニ類・うどんこ病	<b>フーモン</b> 1,000倍 (前日/-回) ※1日0日 *野菜類登録

灰色かび病	<b>セイビアーフロアブル20</b> 【予】 1,000~1,500倍 (前日/3回)
コナジラミ類・アブラムシ類 シカキアザミヤ	<b>ウララDF</b> 2,000倍 (前日/3回) ※1日0日 ※アブラムシ類は2,000~4,000倍

葉かび病 すすかび病	<b>トリフミン水和剤</b> 【予・治】 3,000~5,000倍 (前日/5回) ※すすかび病は3,000倍 ※1日
コナジラミ類 トマトヒゲナシ	<b>クリアザールフロアブル</b> 2,000~4,000倍 (前日/2回) ※1日 ※トマトヒゲナシは2,000倍

## 今月のおすすめ資材 エレマックス 赤・黄

## ペンタキープ Hyper 5,000倍

カリ欠乏対策に！

500~1,000倍で  
10~14日おきに葉面散布

- ★カルシウム剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥との混用は避ける。
- ★草勢が弱い時は、窒素入りのエレマックス黄がおすすめです！

光合成強化！

5-アミノレブリン酸  
(ALA)で光合成効率UP  
新成分 アルギニンで  
吸肥力UP！

N-P-K=8-6-4+微量要素

肥料登録：生第93701号

◆◆新年のご挨拶◆◆

あけまして  
おめでとうございます  
本年も皆様の作物の健康を  
お守りするため、病害虫や  
農業に関する情報をお届け  
致します。本年もどうぞよ  
ろしくお願い致します。



肥料登録番号：輸第9424号  
4-30-20

肥料登録番号：輸第9423号  
0-28-26

