



イチゴ編



病害虫注意報
2019年2月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

作終盤の病害虫の蔓延を防ぐために引き続き定期的な防除をしましょう！

収穫中 おすすめローテーション③

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハバチ	ミカド	刊
薬剤散布前	葉かきをしっかり行い、薬剤のかかりを良くしましょう								
2月①	うどんこ病 灰色かび病	ネクスターフロアブル	1,000倍	前日	3回	翌日	0日		
	ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日	2回	1日	0日		
1~2月頃	ハダニ類	【天敵】スパイデックス (刊ガリガニ) 100ml 3本/10a ・天敵導入後10~14日間は、葉かき及び薬剤散布は控え、天敵の定着を促しましょう ・ダニが多い圃場は、2週続けて天敵を導入しましょう							
2月②	うどんこ病 灰色かび病	カリグリーン ※野菜類登録	800~ 1,000倍	前日	—	0日	0日		
	ハスモンクサギアザミウマ類	カウンター乳剤	2,000倍	前日	4回	1日	0日		

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控え、その日のうちにきちんと乾かしましょう！

新発売情報

100g包装を新発売

ラミック顆粒水和剤

既存の各種耐性菌に対しても優れた効果
有用生物・天敵に影響が少ない

対象病害：うどんこ病、灰色かび病
倍率：1,000倍
使用時期：収穫前日まで
使用回数：2回まで

ベルコートとプロパティの混合剤です。
使用回数に注意して下さい。

今月の防除ポイント

ハダニ対策に
【天敵】スパイデックス
の春放飼を行いましょう！！

また、アザミウマは1度発生してしまうと、
防除が難しくなります。そのため、サイド
や天窓を開ける前に、
ハウス周りの除草を
しましょう！圃場内
への飛び込みを未然
に防ぐ事が大切です。

