



# ミニトマト編



病害虫注意報  
2019年2月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 灰色かび病・葉かび病 特集



質問：灰色かび病が発生したので治療効果のある薬剤を散布したのですが、あまり良くなりません・・・なぜでしょうか？

答え：それは、**灰色かび病薬剤耐性菌**が発生している可能性があります！

Aグループ	Bグループ	Cグループ	耐性菌の種類には3つの型があり、その型に合った薬剤を散布しないと全く効果がありません！
バンレート トップジンM	07ラール	ゲッター	イノチオでは右記A~Cグループの薬剤に対し、皆様の圃場に発生している灰色かび病菌が耐性菌かどうか検定を実施しています。

※この時期は成り疲れになりやすく樹勢が低下していますので、樹勢に応じた管理を行いましょう。

(適切な灌水管理、温度管理、摘果・摘花管理等)

※いずれも多湿条件下で発生が助長されます。適切な温度・湿度管理を行いましょう。

※葉かび病抵抗性品種でもすすかび病は発生しますので、ご注意ください。



## 今月のおすすめ 灰色かび病・葉かび病 同時防除ローテーション

葉かび病・灰色かび病	【予】ベルコート水和剤 6,000倍 (前日/2回) ハチ0日
コジラミ類・アブラムシ類 ミカンイロアザミ	ウララDF 2,000倍 (前日/3回) ハチ0日 ※アブラムシ類は2,000~4,000倍

灰色かび病・菌核病 葉かび病・斑点病 すすかび病	【予・治】ファンタジスタ顆粒水和剤 2,000~3,000倍 (前日/3回) ハチ1日
コジラミ類・アブラムシ類	チェス顆粒水和剤 5,000倍 (前日/3回) ハチ0日

灰色かび病・菌核病	【予・治】ピクシオDF 2,000倍 (前日/4回) ハチ1日
コジラミ類・アブラムシ類 ハダニ類・うどんこ病	フーモン 1,000倍 (前日/-回) ハチ1日 野菜類

灰色かび病 葉かび病・菌核病	【予・治】ゲッター水和剤 1,500倍 (前日/3回) ハチ1日 ※使用回数注意！(トップジンMの混合剤)※汚れ注意 展着剤加用おすすめ
コジラミ類・ミカンイロアザミ トマトヒゲダニ・ミカンイロアザミ	マッチ乳剤 2,000~3,000倍 (前日/2回) ハチ1日 コジラミ類・トマトヒゲダニは2000倍など、適用害虫によって倍率をご確認下さい

光合成能力UP！

### ファイトマジック

マグネシウムと微量元素  
を速やかに補給！

1,000倍 葉面散布



肥料登録：生第87201号

### パンタキープHyper

新成分 アルギニン で吸肥力UP！

5,000倍 葉面散布



肥料登録：生第93701号

草勢維持！バテない株に！

### ファイトメット

◆毛細根を増やし、活力UP！

酵母由来のアミノ酸

メチオニン

キトサンオリゴ糖



肥料登録：生第84050号

100~150g/10aを  
10~14日おきに灌注処理

### NEW SB酸素

◆土壤に酸素を供給！

5~10kg/10aを目安に  
定期的(7~10日おき)に灌注処理！



交互に使うとより効果的！