ナス編

inochio GROUP

病害虫注意報
2019年2月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ミナミキイロアザミウマ等の発生が多い傾向です。
発生を確認したら密度の低いうちに防除しましょう。

◎11月下旬以降アザミウマ類の発生が多い傾向が続いています。新芽や粘着板（青色）を観察して、発生状況を確認するようにして下さい。また、ハウス周りの除草や防虫ネットを設置して、アザミウマ類の発生を予防して下さい。

おすすめ薬剤ローテション

	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数	
						マルハナ	ミツバチ
①	ハスモンヨトウ オオタバコガ ミナミキイロアザミウマ ハモグリバエ類	プレオフロアブル	1,000倍	前日	4回	1日	1日
	うどんこ病　灰色かび病	ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	―	0日
②	タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）アザミウマ類	ファインセーブフロアブル	1,000~2,000倍 ※タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）：1,000倍	前日	3回	1日	1日
	灰色かび病・すすかび病 菌核病・うどんこ病	アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日	0日
③	ｱｻﾞﾐｳﾏ類・ﾊﾀﾞﾆ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ・ﾁｬﾉﾎｺﾘﾀﾞﾆ	アファーム乳剤	2,000倍	前日	2回	3日	2日
	灰色かび病　すすかび病 うどんこ病　ハダニ類 アザミウマ類	ポリオキシンＡＬ水溶剤	5,000倍	前日	3回	0日	3日
④	ｱｻﾞﾐｳﾏ類・ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	ディアナＳＣ	2,500~5,000倍 ※ｺﾅｼﾞﾗﾐ類：2,500倍	前日	2回	1日	3日
	すすかび病・うどんこ病	トリフミン水和剤	3,000~5,000倍 ※すすかび病：3,000倍	前日	5回	1日	1日

根に活力を与え肥効UP

NEW SB酸素

7～14日を目途に
10aあたり10kgを
100～500倍で使用

日射量が少ないこれからの季節におすすめ
植物本来の力を活性化！光合成能力UP!!

ファイトオーツー　1,000倍
光合成量増加！毛細根充実！
抵抗力誘導物質の発生を促す！

ファイトマジック　1,000倍
Mg7.0%、Mn0.2%、B0.1%、他各種微量要素

肥料登録：生第83241号　肥料登録：生第87201号

ｱﾙｶﾘ性農薬、石灰硫黄合剤、ｱﾘﾅｲｼｽﾄﾛﾋﾟﾝ剤（ｱﾐｽﾀｰ）、ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ剤（ｽﾄﾛﾋﾞｰ）、無機銅剤、ﾎﾙﾓﾝ剤、液肥類との混用はさけてください