



キク編

病害虫注意報
2019年3月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

害虫、白さび病の発生に注意しましょう！

春になり、暖かくなってくると虫が動きだします。また、暖房機が稼働しない日は湿度が高くなり、白さび病の発生に適した環境になってしまいます。害虫、白さび病ともにしっかり対策してください！

今月のおすすめローテーション



※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますためご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。

初 生 期 育	アブラムシ類, ハダニ類	サンマイトフロアブル	1,000倍 -/2回
	ヨトウムシ類 ※ アブラムシ類, ハダニ類	マラソン乳剤	2,000~3,000倍 発生初期/6回
	白さび病	ジマンダイセンフロアブル	500~800倍 -/8回



破 蕾 期	ハダニ類, ハモグリバエ類	コロマイト 乳剤	1,500倍 -/2回
	アザミウマ類 オオタバコガ	プリンス フロアブル	2,000倍 発生初期/5回以内
	白さび病, ※ 黒斑病, 灰色かび病 ハダニ類, うどんこ病	ポリオキシシ AL水溶剤	2,500倍 発病・発生初期/8回

消 灯 時	アブラムシ類	アーデント フロアブル	2,000倍 発生初期/5回
	白さび病	Inochio オペラフラワー乳剤	2,000倍 発病初期/3回



発 蕾 期	ハダニ類	※ ダニサラバフロアブル	1,000倍 発生初期/2回
	アブラムシ類, コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	ベストガード水溶剤	1,000倍 発生初期/4回 (アブラムシ類1,000~2,000倍)
	うどんこ病, 白さび病, アブラムシ類	ピリカット乳剤	1,000倍 発病・発生初期/6回 (うどんこ病 2,000倍)



※ 花き類・観葉植物登録

新規登録薬剤のご紹介！！



Inochio セイレーンフロアブル

アブラムシ類, アザミウマ類
2,000倍 発生初期/3回

優れた浸透移行性
長い残効性

スピロテトラマト水和剤 22.4%

暖房機が稼働しにくい時は・・・

4段サーモヤコン



これ1台で4段変温はもちろん、モヤコン機能により多湿環境を改善します。