



ミニトマト編


inochio
GROUP

病害虫注意報
2019年3月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナジラミ類・ハモグリバエ類 対策

天窓開閉の多くなる2月後半からコナジラミ類が増加します！また、ハモグリバエ類の発生も増えてきますので発生初期を見逃さず、しっかり防除を行っていきましょう！




コナジラミ類 アザミウマ類 アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍 前日/3回 1日1回
コナジラミ類 トマト・マメコグリバエ ミカンキイロアザミウマ トマトヒゲダニ オオタバコガ ハスモンヨトウ	カスケード乳剤 2,000~4,000倍 前日/2回 1日2回 ※ミカンキイロアザミウマ・トマトヒゲダニは2,000倍 ※コナジラミ類・ハスモンヨトウ・トマトヒゲダニは4,000倍

コナジラミ類 アブラムシ類	チェス顆粒水和剤 5,000倍 前日/3回 1日1回
コナジラミ類 トマトヒゲダニ ミカンキイロアザミウマ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 オオタバコガ	アニキ乳剤 1,000~2,000倍 前日/3回 1日1回 ※トマトヒゲダニ、ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガは2,000倍

コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ トマトヒゲダニ オオタバコガ ハスモンヨトウ	マッチ乳剤 2,000~3,000倍 前日/2回 1日1回 ※ミカンキイロアザミウマ、トマトヒゲダニ、コナジラミ類は2,000倍 ハスモンヨトウは3,000倍
--	---

コナジラミ類 トマトヒゲダニ ハモグリバエ類 オオタバコガ	アフアーム乳剤 1,000~2,000倍 前日/5回 1日2回
--	--



疫病対策


年内に疫病が発生した圃場では、温度が20℃以上になるこの時期に再び発病する可能性があります！下記の薬剤でしっかり防除しておきましょう！

	薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
予防	ライメイフロアブル	2,000~4,000倍	前日	4回
予防	レーバスフロアブル	2,000倍	前日	3回
予防・治療	ベトファイター顆粒水和剤 ※総使用回数に注意！	2,000倍	前日	3回
予防（・治療）	ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回

日射量回復！株の動きも活発に！
樹勢・環境に合わせた管理の調整を行っていきましょう！

おすすめ葉面散布

アミノ☆サンバ 1000倍



- ・ストレスに対する抵抗力の増強（日照不足、低温、高温、環境ストレス）
- ・サイズや色つやの向上
- ・根張り向上
- ・病害に対する抵抗性向上

酵素の力で植物元気！

根は正常に動いていますか？

NEW SB酸素

5~10kg/10aを目安に灌注処理！

