



# スイートコーン編



病害虫注意報  
2019年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## チョウ目害虫特集

オオタバコガやアワノメイガは、中に潜り込んだら防除が困難です。穂が出始める頃から注意し、タイミング良く防除しましょう！



### 【防除適期】

第一防除期：雄穂の先端がわずかに出だした頃

第二防除期：穂先出始めから1週間後

第三防除期：受粉終了後、雄穂を切り取った直後

※スイートコーンとヤングコーンは登録内容が異なります。使用前に必ずラベルをご確認ください。

### <チョウ目害虫の主な防除薬>

薬剤名	希釈倍率	日数/回数	適用病害虫	ヤングコーンでの使用
アニキ乳剤	1000倍	前日/3回	オオタバコガ	○ 前日/3回
アフーム乳剤	1000~2000倍	3日前/2回	オオタバコガ、ヨトウムシ	○ 前日/2回
カスケード乳剤	2000~4000倍	7日前/2回	アワノメイガ、オオタバコガ (4000倍)	×
コテツフロアブル	2000倍	前日/2回	オオタバコガ、ハダニ類	○ 前日/2回
ゼンターリ顆粒水和剤	1000倍	前日/-	オオタバコガ	○ 前日/- (野菜類登録)
プレバソンフロアブル5	2000倍	前日/3回	アワノメイガ、オオタバコガ	×
フェニックス顆粒水和剤	2000~4000倍	前日/2回	アワノメイガ、オオタバコガ	○ 前日/2回
プレオフフロアブル	1000倍	前日/2回	オオタバコガ	×
粒剤 パダン粒剤4	6kg/10a 株の上から均一に撒粒する。	7日前/2回	アワノメイガ	×

### 登録内容 再確認

とうもろこしは種類によって農薬使用基準が異なります！

スイートコーン  
とうもろこし登録もしくは  
未成熟とうもろこし登録

ヤングコーン・ヘビーコーン  
ヤングコーン登録もしくは  
野菜類登録

スイートコーンの収穫前にヤングコーンを収穫する場合は、必ず どちらにも登録されている薬剤を使用して下さい。

※スイートコーンの農薬使用回数には、ヤングコーンで使用した回数を含めて下さい。

### オススメ葉面散布



## アミノ☆サンバ

### 1000倍

- ▶ ストレスに対する抵抗力の増強(日照不足、低温、高温、環境ストレス)
- ▶ サイズや色つやの向上
- ▶ 根張り向上
- ▶ 病害に対する抵抗性向上

酵素の力で  
植物元気!