



# イチゴ編

inochio  
GROUP

病害虫注意報  
2019年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

苗床での病害虫発生を防ぐためにも 親株床から徹底防除に努めましょう！

## 親株床おすすめローテーション

時期	対象 病害虫	薬剤名	倍率	使用 時期	回数	影響日数	
						ミハガチ	マルハガチ
5月 ①	炭疽病 芽枯病 灰色かび病	オーソサイド水和剤80	予 800倍	30日前	3回	1日	0日
	ハダニ類 シラミ科ワガニ ハモトウ ミナモトアザミ	コテツフロアブル 卵にも活性あり	2,000倍	前日	2回	10日	9日
5月 ②	炭疽病 うどんこ病	サンリット水和剤	予・治 2,000 ~4,000倍 ※炭疽病は2,000倍	前日	3回	—	—
	ハダニ類・アザミ類 シラミ類・うどんこ病	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	—	1日	—
5月 ③	炭疽病 じゃのめ病	シマンダイセン水和剤	予 600倍	仮植栽培期但し 収穫76日 前まで	6回	3日	0日
	ハダニ類 アザミ類 シラミ科ワガニ	アーデント水和剤	1,000倍	前日	4回	2~3日	3日
5月 ④	炭疽病	ゲッター水和剤	予・治 1,000倍	収穫開始 21日前 まで	3回	1日	1日
	ハダニ類・アザミ類 シラミ類・うどんこ病	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	—	1日	—

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

展着剤登録あります！

## フーモン



野菜類登録  
殺菌剤に10ml/散布液10L  
(1000倍)添加

※高温注意  
※混用不可薬剤あり

野菜類登録  
アザミ類・ハダニ類  
シラミ類・うどんこ病  
1,000倍/収穫前日  
回数制限なし 1日



新規登録薬剤です!!

## グレースシア 乳剤

幅広い害虫に速く効きます！  
新規有効成分が抵抗性害虫にも高い効果を示します!!

【登録内容】  
いちご登録  
アザミ類・ハダニ類  
ハモトウ  
2,000倍/収穫前日  
2回まで 1日



## ハダニ類

徹底防除の  
ポイント！



- 薬剤は、葉裏を中心に  
たっぷり散布する
- 発生予防のため、  
定期的に薬剤を散布する
- 気門封鎖剤を活用し、  
抵抗性の獲得を防ぐ
- 本園で使う薬剤は極力使用しない

