キャベツ編

inochio GROUP

病害虫注意報
2019年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナガ・シロイチモジヨトウ対策

コナガ



幼虫



成虫

【初め】
薄皮を残して食害する

【激発時】葉表・葉脈を残すように食害する

幼虫は葉裏で蛹になる。

シロイチモジヨトウ

幼虫

成虫

- 体の側面に白い筋が1本通っている
- 食欲旺盛、狭い場所を好み新葉に入っている場合もある
- 暗灰褐色の小型の蛾である

【おすすめ防除ローテーション】

※シロイチモジヨトウに対しては弊社独自の試験結果より、他害虫との同時防除でも効果が高いと推定される薬剤を選択しています

ウワバ類・コナガ・ハイマダラノメイガ オオタバコガ・ハスモンヨトウ・アオムシ	**アニキ乳剤** 1000～2000倍／収穫3日前まで／3回以内
コナガ・アオムシ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ タマナギンウワバ・ハイマダラノメイガ	**トルネードエースDF** 1000～2000倍／収穫7日前まで／2回以内 ※ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・タマナギンウワバ・ハイマダラノメイガは2000倍
アオムシ・コナガ・ヨトウムシ オオタバコガ・ハイマダラノメイガ	**チューンアップ顆粒水和剤** 2000～3000倍/発生初期、但し収穫前日まで/ー ※野菜類登録　※ヨトウムシは2000倍
アオムシ・コナガ・ハイマダラノメイガ アブラムシ類・ナメクジ類・アザミウマ類	**リーフガード顆粒水和剤** 1500倍／収穫7日前まで／3回以内 ※定植後2週間程度までは薬害の恐れがあるため、使用は避ける
ウワバ類・コナガ・ハスモンヨトウ・アオムシ・ヨトウムシ アザミウマ類・ハイマダラノメイガ・オオタバコガ	**ディアナSC** 2500～5000倍／収穫前日まで／2回以内
タマナギンウワバ・コナガ・ハスモンヨトウ ヨトウムシ・ハイマダラノメイガ・アオムシ	**アファーム乳剤** 1000～2000倍／収穫前日まで／3回以内

アブラムシが多発した場合には!!
トランスフォームフロアブル　2000倍／収穫前日まで／3回以内
モベントフロアブル　2000～4000倍/収穫7日前まで/3回以内

新規登録薬剤です!!

グレーシア乳剤

- コナガ
- ヨトウムシ
- オオタバコガ
- ウワバ類
- ネキアザミウマ
- ハスモンヨトウ
- アオムシ

2,000～3,000倍
7日前まで / 2回以内

幅広い害虫に速く効く！

オススメ葉面散布

アミノ☆サンバ

1000倍

- 病害に対する抵抗性向上
- ストレスに対する抵抗力の増強（日照不足、低温、高温、環境ストレス）
- 根張り向上
- サイズや色つやの向上

酵素の力で植物元気！