



ミニトマト編



病害虫注意報
2019年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

黄化葉巻病(TYLCV)

タバコナジラミ(バイオタイプB,Q)により媒介



- ▶ 芽先が黄化・葉巻症状
- ▶ 節間がつまる



タバコナジラミ 幼虫



タバコナジラミ 成虫

黄化病(ToCV)

コナジラミ類(オンシツ・タバコ)により媒介



- ▶ 葉脈間の黄化
- ▶ 進行するとえそ症状が発生

中下位葉に出やすく、マグネシウム 欠乏症と似た症状です。

暖かくなると天窓の開閉が多くなり、コナジラミ類の飛び込みが増えます。コナジラミによる病気の発生が多くなる時期ですので注意しましょう！

ウイルス病は発病してしまうと治療できません。**感染が疑わしい株は速やかに除去しましょう！**
気になる症状は診断室でお調べします！

今月のおすすめ コナジラミ類・葉かび病 防除ローテーション

薬害回避のために、高温時・多湿時の散布は控え、夕方までにきちんと乾かしましょう！

コナジラミ類 アザミウマ類 ハモトウ
ハダカバエ類 オオバコガ

ディアナSC 2,500~5,000倍 前日/2回
※コナジラミ類は2,500倍 毎1~3日

葉かび病・灰色かび病
菌核病・すすかび病・斑点病

【予・治】ファンタジスタ顆粒水和剤
2,000~3,000倍/散布 前日/3回

コナジラミ類 トマトヒゲニ
ミカンキロアザミウマ ハモトウ
ハダカバエ類 オオバコガ

アニキ乳剤

1,000~2,000倍 前日/3回 毎1日
※トマトヒゲニ、ハダカバエ類、ハモトウ、
オオバコガは2,000倍

葉かび病・菌核病
灰色かび病

【予・治】カンタスDF
1,000~1,500倍 (前日/3回)

コナジラミ類
アブラムシ類

バリアード顆粒水和剤

4,000倍/散布
前日/3回 毎1日

葉かび病

【予・治】ラリー乳剤
2,500~5,000倍/散布
前日/3回

展着剤登録あります！

フーモン



野菜類登録
殺菌剤に10ml/散布液10L
(1000倍)添加
※高温注意 ※混用不可薬剤あり

野菜類登録
アブラムシ類・ハダニ類
コナジラミ類・うどんこ病
1,000倍/収穫前日
回数制限なし 毎1日

新規登録薬剤です!!

グレースシア乳剤



幅広い害虫に速く効きます！
新規有効成分が抵抗性害虫にも
高い効果を示します!!

【登録内容】
ミニトマト登録
コナジラミ類・ハモトウ
トマトハダカバエ
2,000倍/収穫前日
2回まで 毎1日