



トマト編



病害虫注意報
2019年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

黄化葉巻病(TYLCV)

タバコナジラミ(バイオタイプB,Q)により媒介



▶ 葉脈間の黄化
▶ 進行するとえそ症状が発生
中下位葉に出やすく、マグネシウム
欠乏症と似た症状です。

▶ 芽先が黄化・葉巻症状
▶ 節間がつまる

タバコナジラミ
幼虫

タバコナジラミ
成虫

暖かくなると天窓の開閉が多くなり、
コナジラミ類の飛び込みが増えます。
コナジラミによる病気の発生が
多くなる時期ですので注意しましょう！

ウイルス病は発病してしまうと治療できません。
感染が疑わしい株は速やかに除去しましょう！
気になる症状は診断室でお調べします！

今月のおすすめ コナジラミ類・葉かび病 防除ローテーション

薬害回避のために、高温時・多湿時の散布は控え、夕方までにきちんと乾かしましょう！

コナジラミ類 アザミウマ類 ハシロヨトウ
ハゲクワガタ類 材外カガ

ディアナSC 2,500~5,000倍 前日/2回
※コナジラミ類は2,500倍 毎1~3日

葉かび病・灰色かび病
菌核病・すすかび病・斑点病

【予・治】ファンタジスタ顆粒水和剤
2,000~3,000倍/散布 前日/3回

コナジラミ類 トマトヒゲカニ
ミンキイロアザミウマ ハシロヨトウ
ハゲクワガタ類 材外カガ

アニキ乳剤

1,000~2,000倍 前日/3回 毎1日
※トマトヒゲカニ、ハゲクワガタ類、ハシロヨトウ、
材外カガは2,000倍

葉かび病・菌核病
灰色かび病

【予・治】カンタスDF
1,000~1,500倍 (前日/3回)

コナジラミ類
アブラムシ類

バリアード顆粒水和剤

2,000~4,000倍/散布
前日/3回 毎1日

葉かび病

【予・治】ラリー乳剤
2,500~5,000倍/散布
前日/3回

展着剤登録あります！

フーモン



野菜類登録
殺菌剤に10ml/散布液10L
(1000倍)添加

※高温注意 ※混用不可薬剤あり

野菜類登録
アブラムシ類・ハダニ類
コナジラミ類・うどんこ病
1,000倍/収穫前日
回数制限なし 毎1日

新規登録薬剤です!!

グレースシア乳剤



幅広い害虫に速く効きます！
新規有効成分が抵抗性害虫にも
高い効果を示します!!

【登録内容】
トマト登録
コナジラミ類・ハシロヨトウ
トマトハゲクワガタ
2,000倍/収穫前日
2回まで 毎1日