



# トマト編



病害虫注意報  
2019年6月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 栽培終了時の残渣処理特集

ハウス外に出た害虫は露地で繁殖して再び次作で飛来・侵入してきてしまいます！

### コナジラミを外に出さないためには・・・

- ①ハウスを1～2週間締切、ハウス内の温度を50℃以上に上げて蒸し込む  
※温度を上げ過ぎると塩ビ管の糊が溶けたり、資材が変形する恐れがあります。
- ②有効薬剤を散布し、虫を死滅させた後に残渣を外へ出す


#### 持ち出し前のおすすめ薬剤

モベントフロアブル 2,000倍 前日/3回  
+ベストガード水溶剤 1,000～2,000倍 前日/3回



## 土壌消毒のポイント

- ①碎土を丁寧に行う  
・・・固まっている土の内部は消毒されません！
- ②被覆を必ず行う  
・・・被覆を行わないと薬剤が抜けやすくなり、表層しか消毒できません！



### コナジラミ類蔓延防止・古株枯死に

## キルパー 40～60L/10a

水溶液なので水に希釈でき、土などに流すとガスが発生！

- ①灌水チューブによる灌水処理 (50～100倍程度)
- ②処理後は速やかにハウスを締め切り3～7日間放置して下さい。
- ③ガスを感じなくなったら片付け開始です。
- ④培地のガス抜けを確認した後、は種又は植え付けを行って下さい。(処理後15日以降)



詳しい使用方法はお問い合わせ下さい

### 新規登録農薬 新発売!!

## グレーシア乳剤



幅広い害虫に速く効きます！  
新規有効成分が抵抗性害虫にも高い効果を示します!!

【登録内容】  
トマト登録  
コナジラミ類・ハモシト  
トマトモグリバエ  
2,000倍/収穫前日  
2回まで 1日

### オススメ葉面散布

## アミノ☆サンバ 1000倍



- ▶ ストレスに対する抵抗力の増強 (日照不足、低温、高温、環境ストレス)
- ▶ サイズや色つやの向上
- ▶ 根張り向上
- ▶ 病害に対する抵抗性向上

酵素の力で  
植物元気!