



ブロッコリー編



病害虫注意報 2019年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ対策



愛知県の調査でも、
田原・豊橋で
過去10年で最多
と報告がありました!!

- ・成虫は卵塊（数百個）で産卵する
- ・食欲旺盛で酷い食害を起こす
- ・幼虫は背中に1対の黒い斑紋がある

- ・幼虫は体の側面に白い筋が1本通っている
- ・幼虫は狭い場所を好み、新葉に入る場合もある
- ・7月以降、フェロモントラップの誘殺量が多い!



チョウ目害虫おすすめ防除ローテーション

時期	薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
9月①	アフーム乳剤	1,000~2,000倍	3日まで	3回
9月②	グレース乳剤	2,000~3,000倍	7日まで	2回
9月③	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日まで	2回
9月④	コテツフロアブル	2,000倍	3日まで	2回

その他オススメ薬剤

薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	3日前まで	3回
フェニックス顆粒水和剤	2,000~4,000倍	前日まで	2回
プレバソンフロアブル5	2,000倍	前日まで	3回
フローバックDF	1,000倍	前日まで(発生初期)	-
プレオフロアブル	1,000倍	7日前まで	2回
トルネードエースDF	2,000倍	14日前まで	2回

オススメ資材紹介

高温少雨の年は

カルシウム欠乏に注意!!

ファイトカル



500~1000倍

新葉の縁枯れ対策に!
農薬との混用散布も
おすすめです!

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません



(肥料登録:
生第83188号)

新規登録農薬!!

グレース乳剤

幅広い害虫に速く効きます!
抵抗性害虫にも高い効果を示します!!



【登録内容】

コガ・アムシ・ヨトウムシ

2,000~3,000倍

収穫7日前まで/2回以内

キャベツCa欠乏の症状