



# ミニトマト編

## 病害虫注意報 2019年9月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### マルハナバチ導入前特集

農薬の使用回数は限られているため、マルハナバチ導入前はハチへの影響日数の長い農薬を使用し、影響日数の短い農薬は後にまわしましょう。

#### 葉かび・すすかび病対策

葉かび病・すすかび病を出さないためには、薬剤の予防散布が重要です！  
どちらの病気も潜伏期間が約2週間あり、「症状が出ていない＝感染していない」ではありません。症状が出てからでは遅いので、予防を心掛けてください。

#### コナジラミ類対策

バイオタイプQに有効とされる薬剤

- ・アルバリン顆粒水溶剤
- ・ディアナSC
- ・コロト顆粒水和剤
- ・コロト顆粒水和剤
- ・ベストガード水溶剤
- ・トランスフォームフロアブル
- ・クリアザールフロアブル
- ・モベントフロアブル
- ・ダニトロンフロアブル
- ・フーモン など



葉かび病、すすかび病は共に多温条件下で発病しやすい特徴があります。換気が不十分な場所や摘葉の枚数等を再度確認し、適切な対策を打ちましょう！

トマト黄化葉巻病はTYLCVというウイルスによる病気で、タバココナジラミ(バイオタイプB,Q)によって媒介されます。

### 今月のおすすめローテーション

葉かび病・すすかび病・コナジラミ類対策  
ハチへの影響日数の長い薬剤を使用しています

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
9月 ①	すすかび病・葉かび病 うどんこ病・菌核病 灰色かび病・斑点病	アフェットフロアブル	2,000~4,000倍 (うどんこ病以外2,000倍)	前日	3回	1日
	コナジラミ類・アブラムシ類	コロト顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	7日
9月 ②	葉かび病・すすかび病 うどんこ病・灰色かび病 斑点病	ベルコートフロアブル	4,000倍	前日	2回 ※回数注意	0日
	コナジラミ類・アブラムシ類 アザミウマ類 クハバネコバエ類	ベストガード水溶剤	1,000~2,000倍 (クハバネコバエ類は2,000倍)	前日	3回	10日以上
9月 ③	すすかび病・葉かび病	トリフミン水和剤	3,000~5,000倍 (すすかび病は3,000倍)	前日	5回 ※回数注意	1日
	コナジラミ類・アブラムシ類 トマトヒゲダニ	トランスフォームフロアブル	1,000~2,000倍 (アブラムシ類は2,000倍)	前日	2回	2~5日
9月 ④	菌核病・斑点病 すすかび病・葉かび病 灰色かび病	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000倍	前日	3回	1日
	コナジラミ類・カメムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	2,000~3,000倍 (カメムシ類は2,000倍)	前日	2回	14日以上

高温対策に！

#### すずみどり

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防！  
更に光合成を向上  
効果の持続は約1か月  
ハウス内に吊るすだけ  
10a当たり10~20錠



萎れ・葉焼け対策

#### ファイトカル

1,000倍 葉面散布  
優れた展着性と浸透性！  
グリシンバタの新配合！  
尻腐れ果対策にもおすすめです！  
※混用にご注意ください  
詳細は担当まで



肥料登録：生第83188号

軟弱徒長株を強く！

#### エレマックス赤

0-28-26  
1,000倍 葉面散布  
樹を締めて徒長防止！  
花芽分化・着果(花)の向上に！



肥料登録：輸第9423号