



トマト編



病害虫注意報 2019年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

マルハナバチ導入前特集

農薬の使用回数は限られているため、マルハナバチ導入前はハチへの影響日数の長い農薬を使用し、影響日数の短い農薬は後にまわしましょう。

葉かび・すすかび病対策

葉かび病・すすかび病を出さないためには、薬剤の予防散布が重要です！
どちらの病気も潜伏期間が約2週間あり、「症状が出ていない=感染していない」ではありません。症状が出てからでは遅いので、予防を心掛けてください。



コナジラミ類対策

バイオタイプQに有効とされる薬剤

- ・アルバリン顆粒水溶剤
- ・ディアナSC
- ・コロマイト乳剤
- ・コルト顆粒水和剤
- ・ファインセーブフロアブル
- ・トランスフォームフロアブル
- ・クリアゼールフロアブル
- ・モベントフロアブル
- ・アプロードエースフロアブル
- ・フーモン
- ・ベストガード など



葉かび病、すすかび病は共に多湿条件下で発病しやすい特徴があります。換気が不十分な場所や摘葉の枚数等を再度確認し、適切な対策を打ちましょう！

トマト黄化葉巻病はTYLCVというウイルスによる病気で、タバココナジラミ(バイオタイプB,Q)によって媒介されます。

今月のおすすめローテーション

葉かび病・すすかび病・コナジラミ類対策
ハチへの影響日数の長い薬剤を使用しています

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
9月 ①	すすかび病・葉かび病 うどんこ病・菌核病 灰色かび病	アフエットフロアブル	2,000~4,000倍 (うどんこ病以外2,000倍)	前日	3回	1日
	コナジラミ類・アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	7日
9月 ②	葉かび病・すすかび病 うどんこ病・灰色かび病	ベルコートフロアブル	2,000~4,000倍	前日	3回 ※回数注意	0日
	コナジラミ類・アブラムシ類 アザミヤカ類 カバネコバエ類	ベストガード水溶剤	1,000~2,000倍 (カバネコバエ類は2,000倍)	前日	3回	10日以上
9月 ③	すすかび病・葉かび病	トリフミン水和剤	3,000~5,000倍 (すすかび病は3,000倍)	前日	5回 ※回数注意	1日
	コナジラミ類・アブラムシ類 トマトバグ	トランスフォームフロアブル	1,000~2,000倍 (アブラムシ類は2,000倍)	前日	2回	2~5日
9月 ④	菌核病・斑点病 すすかび病・葉かび病 灰色かび病	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000倍	前日	3回	1日
	コナジラミ類・カメムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	2,000~3,000倍 (カメムシ類は2,000倍)	前日	2回	14日以上

高温対策に！

すずみどり

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上
効果の持続は約1か月
ハウス内に吊るすだけ
10a当たり10~20錠



萎れ・葉焼け対策

ファイトカル

1,000倍 葉面散布
優れた展着性と浸透性！
グリシンパタイン新配合！
尻腐れ果対策にもおすすめです！
※混用にご注意ください
詳細は担当まで



肥料登録：生第83188号

軟弱徒長株を強く！

エレマックス赤

0-28-26
1,000倍 葉面散布
樹を締めて徒長防止！
花芽分化・着果(花)の向上に！



肥料登録：輸第9423号