



トマト編

病害虫注意報 2019年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

マルハナバチ導入後のコナジラミ防除



黄化葉巻(TYLCV)



黄化病(ToCV)

コナジラミは黄化葉巻 (TYLCV) だけでなく、新しいウイルス病「黄化病(ToCV)」も媒介します。TY抵抗性品種でもコナジラミ防除を行いましょう！！

愛知H28病害虫発生予察特殊報 第2報より



タバココナジラミ



今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
10月①	コナジラミ類・オタバコガ トマトサビダニ・ハメグリバエ類	アフーム乳剤	2,000倍	前日	5回	2日
10月②	コナジラミ類・アザミウマ類 ハモンヨウ・オタバコガ ハメグリバエ類	ディアナSC	2,500~5,000倍 (コナジラミ類は2,500倍)	前日	2回	1~3日
10月③	アブラムシ類・コナジラミ類	チェス顆粒水和剤	5,000倍	前日	3回	0日
	コナジラミ類・アブラムシ類 ハダニ類・うどんこ病	フーモン	1,000倍	前日	-	1日
10月④	コナジラミ類・アブラムシ類	バリアード顆粒水和剤	2,000~4,000倍	前日	3回	1日

★ハチ導入後のチョウ目害虫対策 露地ではチョウ目害虫が発生しています！引き続き注意しましょう！

対象害虫	薬剤名	希釈倍率	使用時期	回数	ハチ影響日数
ハモンヨウ・オタバコガ	フェニックス顆粒水和剤	2,000~4,000倍	前日	2回	1日
ハモンヨウ・トマトハメグリバエ コナジラミ類	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日
オタバコガ・コナジラミ類 トマトサビダニ・ハモンヨウ ミカンキイロアザミウマ・ハメグリバエ類	マッチ乳剤	1,000~3,000倍 (害虫によって異なります)	前日	4回	1日

光合成能力UP!

ファイトマジック
1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム
+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!
★根に活力を与える!



肥料登録 生第87201号

軟弱徒長予防に!

液状複合肥料

ツートップ48
0-29-19
1,000~2,000倍
葉面散布

※石灰硫黄合剤などのアルカリ性農薬や、ホルモン剤・カルシウム入りの肥料との混用不可。銅剤との混用及び近接散布は避ける。輪第13355



肥料登録 生第13355号

弱った株の回復に!

カテキンパワー
1,000倍 葉面散布

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録 生第91402号