



# トマト編

病害虫注意報 2020年3月号




※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## コナジラミ類・ハモグリバエ類 対策

天窓開閉の多くなる2月後半からコナジラミ類が増加します！また、ハモグリバエ類の発生も増えてきますので発生初期を見逃さず、しっかり防除を行っていきましょう！

### 今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
3月 ①	コナジラミ類・ハモグリバエ類 トマトヒゲダニ・オオハコガ ミンキイロアザミウマ・ハモンイトウ	マッチ乳剤	1,000～3,000倍 (ハモグリバエ類1,000倍 ミンキイロアザミウマ1,000～2,000倍 コナジラミ類・トマトヒゲダニ2,000倍 オオハコガ2,000～3,000倍 ハモンイトウ3,000倍)	前日	4回	1日
	うどんこ病・ハダニ類 コナジラミ類・アブラムシ類	フーモン	1,000倍	前日	-	1日
3月 ②	トマトヒゲダニ・コナジラミ類 ハモグリバエ類・オオハコガ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	5回	2日
3月 ③	コナジラミ類・アブラムシ類	バリアード顆粒水和剤	2,000～4,000倍	前日	3回	1日
	ハモグリバエ類・オオハコガ	プレバソンフロアブル5	1,000～2,000倍 (オオハコガ2,000倍)	前日	3回	1日
3月 ④	コナジラミ類・トマトヒゲダニ	クリアザールフロアブル	2,000～4,000倍 (トマトヒゲダニ2,000倍)	前日	2回	1日
	うどんこ病・ハダニ類 コナジラミ類・アブラムシ類	フーモン	1,000倍	前日	-	1日



## 灰色かび病対策オススメ剤



薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数	影響日数 マルハナバチ
予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日まで	3回	1日
予・治 シグナムWDG	2,000倍	前日まで	2回	0日
予・治 ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000～3,000倍	前日まで	3回	0日
予・治 ピクシオDF	2,000倍	前日まで	4回	1日
予 ネクスターフロアブル	1,000倍	前日まで	3回	1日

### 萎れ・葉焼け対策に

## ファイトカル

1,000倍 10～14日おきに葉面散布

- ▶優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを!!
- ▶有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤  
液肥類との混用は出来ません  
肥料登録 生第83188号



### 高温対策に!

効果の持続は約1か月

## すずみどり

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防！  
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ  
10a当たり10～20錠

