



トマト編

病害虫注意報 2020年4月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

トマトサビダニ特集

極めて微小で、目には見えない害虫です。気象条件も良く、生育が旺盛になり作業管理に追われるこの時期によく目にします。発生に注意して予防散布を心がけていきましょう！

温度	発育日数（日）		
	卵	幼虫～若虫	合計
15℃	8.3	8.8	17.1
25℃	3.1	2.4	5.5
30℃	2.2	2.4	4.6

このような症状に注意！

25℃では、卵の比率は約7割で、約25日の寿命中に1卵あたり約50卵産みます！



くすんだ褐色の茎→

たった5日で卵～成虫に！

暖かくなり、コナジラミ類等の害虫の活動も活発になります。早めの対策を行っていきましょう！



今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハバチ
4月①	うどんこ病 コナジラミ類 トマトサビダニ	予 パルミノ	2,000倍	前日	5回	カマルハチ 1日
4月②	トマトサビダニ ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日	1回	1日
4月③	うどんこ病 アブラムシ類 コナジラミ類・ハダニ類	フーモン	1,000倍	前日	-	1日
4月④	コナジラミ類 トマトサビダニ ハダニ類	コロマイト乳剤	1,500倍	前日	2回	1日

軟弱徒長株を強く！

エレマックス赤

0-28-26

1,000倍 葉面散布

樹を締めて徒長防止！
病害抵抗力の向上に！

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください
※カテキンパワーとの混用は可能です



肥料登録
輸第9423号

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル

1,000倍 葉面散布

優れた展着性と浸透性！
グリシパ®タイン新配合！
尻腐れ果対策にもおすすめです！

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号

新規登録農薬紹介

兼商 ヨーバルフロアブル

☆ 幅広い殺虫スペクトル 3月16日発売！

☆ IRACコード：28

☆ マルハバチ：灌注1日、散布14日

ハダニ類・アブラムシ類
コナジラミ類・ハモンヨトウ
灌注・散布 登録
詳しい登録内容は
お問い合わせください！！

