



トマト編

病害虫注意報 2020年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

黄化葉巻病(TYLCV)

タバコナジラミ(ハイタイフ B,Q)により媒介

黄化病(ToCV)

コナジラミ類(オシツ・タバコ)により媒介



▶ 葉脈間の黄化
▶ 進行するとえそ症状が発生
中下位葉に出やすく、マグネシウム欠乏症と似た症状です。

- ▶ 芽先が黄化・葉巻症状
- ▶ 節間がつまる

暖かくなると天窓の開閉が多くなり、コナジラミ類の飛び込みが増えます。
病気の発生を防ぐために、早めの対策を行いましょ！

**ウイルス病は発病してしまうと治療できません。
感染が疑わしい株は速やかに除去しましょう！
気になる症状は診断室でお調べします！**

今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハバチ
5月 ①	葉かび病・灰色かび病 菌核病・すすかび病 斑点病	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000倍	前日	3回	0日
	コナジラミ類・アザミヤメ類 ハスモンヨトウ・オタバコガ ハゲクリバエ類	ディアナSC	2,500~5,000倍 (コナジラミ類2,500倍)	前日	2回	1~3日
5月 ②	うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	-
	コナジラミ類・アブラムシ類	バリアード顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	1日
5月 ③	葉かび病・菌核病 灰色かび病	カンタスドライフロアブル	1,000~1,500倍	前日	3回	0日
	コナジラミ類・トマトヒゲタニ ミカンキロアザミヤメ・ハスモンヨトウ ハゲクリバエ類・オタバコガ	アニキ乳剤	1,000~2,000倍 (トマトヒゲタニ・ハスモンヨトウ・ハゲクリバエ類・オタバコガ2,000倍)	前日	3回	1日

高温対策に！

すずみどり

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ！
10a当たり10~20錠

効果の持続は約1か月



軟弱徒長株を強く！

エレマックス赤

1,000倍 葉面散布

0-28-26

花芽分化・着果(花)の向上に！

樹を締めて徒長防止！

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください
※カテキンパワーとの混用は可能です



展着剤登録あります！

フーモン

気門封鎖剤を利用して
他剤の使用回数を抑えましょう！

野菜類登録
アブラムシ類・ハゲクリバエ類
コナジラミ類・うどんこ病
1,000倍/収穫前日
回数制限なし 1日1回

※高温注意
※混用不可薬剤あり

