



イノチオ診断室からの 病害虫情報

2020年
7月号



キクの**白さび病**が発生しやすい時期です！
発生しないように防除をしっかりと行いましょう！



白さび病 葉表



白さび病 葉裏

症状	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 葉裏に小さな白い小斑点が形成され、後に淡褐色・イボ状の病斑が形成される ▶ 葉表には円形淡黄緑色～黄色の病斑が見られる など
多発条件	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 多湿条件(90%以上)や葉の結露 ▶ 肥料不足や窒素過多 ▶ 3月～梅雨明けの多雨時期と9～10月頃の冷涼な時期
対策	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 育苗段階から定期的な予防的薬剤散布 ▶ 施設内の換気（サイド・天窓の開放） ▶ 循環扇の利用 ▶ 被害株の圃場外への除去

※農薬はラベルを確認後
ご使用ください。

inochio
オペラフラワー乳剤
白さび病に高い防除効果！

- ▶ 低濃度でも優れた効果！
- ▶ 高い浸達性と残効性 **2000倍**
- ▶ 速やかな効果発現 **発病初期/3回**



inochio
キクツチャ粒剤
白さび病に抵抗する力を活性化！

- ★有効成分がキクの抵抗性を誘導
- ★効果の持続性に優れる
- ★耐性菌が出にくい

定植時 **6～9kg/10a**
作条土壌混和/1回



⚠ 病害虫発生予報 ⚠

※『あいち病害虫情報』発生予報第4号より（7月2日発表）
<https://www.pref.aichi.jp/site/byogaichu/yosat2020.html>

作物名	病害虫名	発生量	作物名	病害虫名	発生量	作物名	病害虫名	発生量
イネ	いもち病	やや多い	キク	ハダニ類	多い	モモ	ナシメジカケ	やや多い
	紋枯病	やや多い	ウンシュウミカン	そうか病	多い		ハダニ類	多い
	かみじり類	多い		チャノドアザミマ	やや多い	ブドウ	べと病	やや多い
	仔エンジヤシ	やや多い	カキ	角斑落葉病 円星落葉病	やや多い	ナシ	ナシメジカケ	やや多い
						果樹全般	かみじり類	やや多い



気象庁1か月予報



気温：高い 降水量：平年並み
日照時間：平年並み

過去の診断室情報は
右のQRコードから！
毎月の防除情報も
配信しています！

