



ハクサイ編

病害虫注意報 2020年9月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫・アブラムシ類・軟腐病の防除

高温少雨が続きますと、チョウ目害虫やアブラムシ類などが多発傾向です。台風の影響を受けると、病害も感染しやすい状態になるのでご注意ください。

チョウ目害虫



コナガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ、オオタバコガなど

薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	回数
グレーシア乳剤	2,000~3,000倍	7日前まで	2回
アニキ乳剤	1,000~2,000倍	3日前まで	3回
トルネードエースDF	1,000~2,000倍	7日前まで	2回
ディアナSC	2,500~5,000倍	前日まで	2回
アフーム乳剤	1,000~2,000倍	7日前まで	3回

アブラムシ類



薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	回数
アルバリン顆粒水溶剤	2,000~3,000倍	3日前まで	2回
ウララDF	2,000~3,000倍	前日まで	2回
コルト顆粒水和剤	4,000倍	3日前まで	3回
モベントフロアブル	4,000倍	7日前まで	3回
トランスフォームフロアブル	2,000倍	3日前まで	3回
パダンSG水溶剤	1,500倍	7日前まで	3回

軟腐病



薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	回数
スターナ水和剤	1,000倍	7日前まで	3回
バリダシン液剤5	500倍	3日前まで	3回
キノドーフロアブル	1,000倍	30日前まで	5回

耕種的防除のポイント

- ▶ ほ場の排水を良くし、特に雨水が停滞しないようにする
- ▶ 窒素肥料の多用を避け、作物を軟弱にしない

弱った株の回復に！

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物が傷ついた時にオススメです！

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録 生第91402号

新規登録農薬紹介

兼商 ヨーバル®フロアブル

- ☆ 幅広い殺虫スペクトル
- ☆ IRACコード：28(ジアミド系)

アブラムシ類・コナガ・ネリムシ類
ハイマダラノメイガ・ハスモンヨトウ・アオムシ
ヨトウムシ・オオタバコガ・シロイチモジヨトウ
灌注・散布 登録

詳しい登録内容はお問い合わせください！！



萎れ・葉焼け予防

ファイトカル

1,000倍

10~14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた着着性・浸透性で、葉先までカルシウムを！！
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤液肥類との混用は出来ません



肥料登録 生第83188号