



# レタス編



## 病害虫注意報 2020年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### ☆育苗～定植時のおすすめ粒剤・灌注剤

対象病害虫	薬剤名	使用量・方法	時期	回数	非結球レタス登録
斑点細菌病・腐敗病	<b>オリゼメート粒剤</b>	6～9kg/10a・土壌混和	定植時	1回	○
アブラムシ類	<b>ダントツ粒剤</b>	0.5g/株・株元処理	育苗期後半	1回	○
		50g/セルレイ・上から散布			×
アブラムシ類	<b>ミネクトデュオ粒剤</b>	6g/培土L・育苗培土混和	は種前	1回	×
ヒメフテンヨコバイ			育苗期後半		○
アブラムシ類・ハメグリバ工類 オタバコガ・ネリムシ類		40g/セルレイ・散布	は種覆土後～ 育苗期後半		リーフ○ 非結球は育苗 期後半のみ
			1g/株・株元散布		定植時



### 注意

ミネクトデュオ粒剤を使用した場合、下記の薬剤は苗場での使用ができません!!

- ベリマークSC
- ジュリボフロアブル
- プリロツツ粒剤
- アクタラ顆粒水溶剤
- アクタラ粒剤5
- ベネビアOD
- アベイル粒剤



### ★育苗期の病害虫対策

※非結球レタス類は登録内容をご確認後、使用して下さい。

対象病害虫	薬剤名	使用量	時期	回数	非結球レタス登録
すそ枯病・べと病 灰色かび病(レタス)	<b>ダコニール1000</b>	1,000倍(散布)	14日前まで (リーフ:21日前)	3回 (リーフ:2回)	リーフ
すそ枯病・軟腐病 腐敗病	<b>バリダシン液剤5</b>	800倍	7日前まで	3回	○
ハメグリバ工・アザミウマ類(レタス) オタバコガ・ハスモンヨトウ	<b>プレオフロアブル</b>	1,000倍	7日前まで	2回	リーフ 立ちちしゃ
ハメグリバ工・オタバコガ ハスモンヨトウ	<b>アフーム乳剤</b>	1,000～2,000倍	3日前まで	3回	○

**軟弱徒長株を強く!** 0-28-26

**エレマックス赤** 1,000倍 灌注

▶樹を締めて徒長防止!  
▶病気抵抗力の向上!

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモ剤との混用は避けてください

**光合成能力UP!** & 1,000倍 灌注

**ファイトオーツ**

植物本来の力を活性化☆

▶転流量増加  
▶毛細根の充実  
▶抵抗性誘導物質の向上

**新規登録農薬紹介**

**兼商 ヨーバルフロアブル**

☆ 幅広い殺虫スペクトル  
☆ IRACコード: 28(ジアミド系)

**非結球レタス登録あり!**

アブラムシ類・ウバ工類  
ハメグリバ工類・ヨトウシ  
ハスモンヨトウ・オタバコガ  
灌注・散布 登録

詳しい登録内容はお問い合わせください!!

**登録変更・拡大情報**

**ベルコート水和剤**  
レタス 菌核病・灰色かび病  
収穫30日前→**収穫14日前**

**アディオン乳剤**  
レタス リーフレタス  
ヨトウシ アブラムシ類  
収穫7日前→**収穫3日前**

**非結球レタス** アブラムシ類登録拡大