



キク編



病害虫注意報 2020年10月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

各種病害虫の発生に注意！

今月は各種病害虫（ダニ・アザミウマ・チョウ目類・アブラムシ・白さび病）の最適な温度・湿度環境になり、多発が予想されます。特定の病害虫に偏らない防除が必要です。

薬剤散布は予防的に行いましょう！

今月のおすすめローテーション



地域の防除事例を基に作成しています（輪菊栽培）。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合があります。ご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。

※…花き類・観葉植物登録

時期	対象病害虫	薬剤名	使用量・倍率	使用時期	回数
定植時	白さび病	予 inochioキクツチャ粒剤	6~9kg/10a (作条土壌混和)	定植時	1回
生育初期	白さび病	予 ジマンダイセンフロアブル	500~800倍	-	8回
	アザミウマ類・アブラムシ類 ハダニ類	inochio セイレーンフロアブル	2,000倍	発生初期	3回
消灯時	白さび病	予・治 カナメフロアブル	4,000~8,000倍	発病初期	3回
	アブラムシ類・アザミウマ類 アザミウマ類・ハダニ類	トクチオン乳剤	1,000倍	発生初期	5回
発蕾時	白さび病	予・治 inochioオペラフラワー乳剤	2,000倍	発生初期	3回
	アブラムシ類・アザミウマ類	トランスフォームフロアブル	1,000~2,000倍 (アブラムシ類2,000倍)	発生初期	3回
破蕾時	白さび病・うどんこ病	予・治 アンビルフロアブル	1,000倍	発病初期	7回
	アザミウマ類・ハダニ類	アグリメック※	500倍	発生初期	5回

光合成能力UP！

ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム
+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP！

★日照不良時の代謝の向上



肥料登録
生第87201号

萎れ防止に！

プロテックa

500~1,000倍

葉面散布

カルシウム、パラフィン配合
植物表皮を保護強化



登録拡大情報

トルネードエースDF

- ▶ チョウ目害虫に高い効果
- ▶ 温度の影響を受けにくい
- ▶ 長い残効性

ハスモンヨトウ
2,000倍/発生初期
4回以内

