



ナス編

病害虫注意報 2020年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

厳寒期の管理に注意しましょう!



症状

- ▶ 葉の裏面に白っぽいカビが固まったような小斑点を生じる
- ▶ 病斑部のカビは灰褐色～すす状に変わる
- ▶ 葉の表面の病斑は淡黄褐色～褐色となる

多発条件・対策

- ▶ ハウスの温度が23～28℃で湿度が高いと多発する
- ▶ 地表面はマルチし、残渣や発病葉はハウス外に処分する
- ▶ 風通しを良くし、過繁茂を避ける

症状

- ▶ 葉・葉柄・茎は褐色～暗褐色の病斑部に灰色のかびを生じる
- ▶ 果実ではまず咲き終わった花弁にカビを生じ、果実部分に茶褐色水浸状の病斑を生じ、病斑部に灰色のかびを密生する

多発条件・対策

- ▶ 施設栽培の晩秋から春の20℃前後・多湿条件で多発
- ▶ 朝夕の急激な冷え込みは発生を著しく助長する
- ▶ 早朝加温・換気・マルチなどが温度低下に有効

今月のおすすめローテーション

※カンタスドライブフロアブルとの使用回数注意

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数		
						ミツバチ	マルナ	スワルスキー
12月①	菌核病・すすかび病・うどんこ病 灰色かび病・褐色斑点病	シグナムWDG	1,500倍 (すすかび1,500～2,000倍)	前日	3回※	0日		0日
	ハダニ類・ハモトウ・コナジラミ類 アザミウマ類・トマトハダニ オオハダニ・チャノコリガ	グレース乳剤	2,000倍	前日	2回	1日		100日以上
12月②	うどんこ病・菌核病・灰色かび病 褐色斑点病・黒枯病・すすかび病	ネクスターフロアブル	1,000倍	前日	3回	1日		0日
	アブラムシ類・カメムシ類 コナジラミ類・ミミキアザミウマ	ベストガード水溶剤	1,000～2,000倍	前日	3回	10日以上		0日
12月③	菌核病・灰色かび病	ピクシオDF	2,000倍	前日	4回	1日		0日
	コナジラミ類・アザミウマ類・ハダニ類 ハダニ類・オオハダニ・ハモトウ チャノコリガ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	2回	2日		7日

スワルスキーカブリダニを放飼する場合は薬剤の選択に注意しましょう!

新規登録農薬紹介

兼商 **ヨーバルフロアブル**

☆ 幅広い殺虫スペクトル
☆ IRACコード：28

ハダニ類・アブラムシ類
コナジラミ類・ハモトウ・オオハダニ
灌注・散布 登録

詳しい登録内容は
お問い合わせください!!

新規登録農薬紹介

ダニオーテフロアブル

★ハダニ類の全ステージに活性を示します。
★天敵・有用昆虫への影響が少ないです。

ハダニ類 2,000倍
前日まで/2回

※銅剤との混用不可。近接散布に注意。

登録拡大農薬紹介

モベントフロアブル

病害登録されました!

うどんこ病・アブラムシ類
コナジラミ類・アザミウマ類
ハダニ類・チャノコリガ
灌注・散布登録

詳しい登録内容は
お問い合わせください!!