



# スイートコーン編

病害虫注意報 2021年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## チョウ目害虫特集

雄穂



雌穂



オオタバコガやアワノメイガは、中に潜り込んだら防除が困難です。穂が出始める頃から注意し、タイミング良く防除しましょう！

### 【防除適期】

第一防除期：雄穂の先端がわずかに出だした頃

第二防除期：穂先出始めから1週間後

第三防除期：受粉終了後、雄穂を切り取った直後

### チョウ目害虫の主な防除薬剤

※スイートコーンとヤングコーンは登録内容が異なります。使用前に必ずラベルをご確認ください。

対象病害虫	薬剤名	倍率	時期	回数	ヤングコーンでの使用
アブラムシ類	アドマイヤーフロアブル	4,000倍	14日前	2回	○3日前/2回
オオタバコガ ヨトウムシ・ツマジロクサヨトウ	アフーム乳剤	1,000~2,000倍	3日前	2回	○前日/2回
オオタバコガ アワノメイガ・ツマジロクサヨトウ	カスケード乳剤	2,000~4,000倍 (オオタバコガ4,000倍 ツマジロクサヨトウ2,000倍)	7日前	2回	×
オオタバコガ・ハダニ類	コテツフロアブル	2,000倍	前日	2回	○前日/2回
オオタバコガ ハスモンヨトウなど(野菜類登録)	ゼンターリ顆粒水和剤	1,000~2,000倍	発生初期 (但し収穫前日まで)	-	○前日/- (野菜類登録)
アワノメイガ オオタバコガ・ツマジロクサヨトウ	兼商ヨーバルフロアブル	5,000倍	前日	3回	×
オオタバコガ アワノメイガ・ツマジロクサヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2,000~4,000倍	前日	2回	○前日/2回
オオタバコガ	プレオフロアブル	1,000倍	前日	2回	×
アワノメイガ	パダン粒剤4	6kg/10a (株の上から均一に散粒)	7日前	2回	×

### 登録内容 再確認

とうもろこしは種類によって農薬使用基準が異なります！

#### スイートコーン

とうもろこし登録もしくは  
未成熟とうもろこし登録

#### ヤングコーン・ベビーコーン

ヤングコーン登録もしくは  
野菜類登録

スイートコーンの収穫前にヤングコーンを収穫する場合は、必ずどちらにも登録されている薬剤を使用して下さい。

※スイートコーンの農薬使用回数には、ヤングコーンで使用した回数を含めて下さい。

### 展着剤登録あります！

## フーモン

気門封鎖剤を利用して  
他剤の使用回数を抑えましょう！

#### 野菜類登録

アブラムシ類・ハダニ類  
コサゲラミ類・うどんこ病  
1,000倍/収穫前日  
回数制限なし

※高温注意  
※混用不可薬剤あり

