



ネギ編

病害虫注意報 2021年8月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

◆ 従来とは異なる系統のハモグリバエが発生中 ◆



従来の系統のネギハモグリバエ（A系統）に比べ、新系統（B系統）は1葉あたりの幼虫数が多いため、被害が甚大化することがあります！発生時は系統にかかわらず、登録薬剤を散布するとともに、発生の原因となる被害葉・収穫残渣は圃場内に放置しないようにしてください。

今月のおすすめ薬剤

ねぎ/ハモグリバエ登録薬剤抜粋

IRACコード	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数
4A	ネギアミウマ類、ネギハモグリバエ類、加バネギバエ類	ベストガード水溶剤	1,000~2,000倍	前日	3回
6	ハモグリバエ類、シロイモシヨトウ	アフーム乳剤	1,000~2,000倍 (ハモグリバエ類は1,000倍)	7日前	3回
6	アザミウマ類、ネギハモグリバエ	アグリメック	500~1,000倍	3日前	3回
13	ヒョウタンゾウムシ類、ネギハモグリバエ類、ネギコガ、シロイモシヨトウ	コテツフロアブル	2,000倍	7日前	2回
21A	アブラムシ類、アザミウマ類、ネギハモグリバエ、ネギコガ、シロイモシヨトウ、さび病、べと病	ハチハチ乳剤	1,000倍	7日前	2回
28	アザミウマ類、ハモグリバエ類、シロイモシヨトウ	ベネビアOD	2,000倍	前日	3回
28	アザミウマ類、ハモグリバエ類、ネギコガ、シロイモシヨトウ、加バネギバエ類	ヨーバルフロアブル	2,500~5,000倍 (加バネギバエ：2,500倍)	3日前	3回
30	アザミウマ類、ネギハモグリバエ類、ネギコガ、シロイモシヨトウ、加バネギバエ類	グレーシア乳剤	2,000~3,000倍	7日前	2回
-	アザミウマ類、ネギハモグリバエ	ファインセーブフロアブル	1,000~2,000倍 (ネギハモグリバエ：2,000倍)	3日前	3回

マグマSi

吸収性の高い水溶性ケイ酸資材

- ①細胞壁の強化
- ②高温・低温への抵抗性
- ③成長促進・抑制のコントロール

〈葉面散布〉育苗期2,000倍（春夏）
成長期5,000~10,000倍
〈灌水〉原液100~200ml / 反
倍率コントロール
20,000~50,000倍



おすすめ資材 植物本来の力を活性化！

光合成能力UP!

軟弱徒長株を強く!

0-28-26

ファイトオーツ & エレマックス赤

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

- ▶ 転流量増加
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上



- ▶ 樹を締めて徒長防止!
- ▶ 病害抵抗力の向上に!



肥料登録
生第83241号

肥料登録
輸第9423号