



キャベツ編

病害虫注意報 2021年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目・細菌病対策

今月も引き続きチョウ目には注意しましょう。特に秋に向かい発生が増えるコナガには要注意です。また発生適温になる細菌病も増えてくるため、予防的な散布を心掛けましょう。

コナガ



被害

- ▶ 薄皮や葉脈を残した食害
- ▶ 結球前の中心葉に隠れ、新芽を食害

多発条件

- ▶ 25~30℃程度
- ▶ 少雨の年

黒腐病



症状

- ▶ 葉縁のV字病斑
- ▶ 維管束の黒変

多発条件

- ▶ 台風などによる激しい風雨
- ▶ 虫害の酷い圃場
傷口から病原菌が侵入

今月のおすすめローテーション

対象害虫によって使用倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
10月①	黒腐病	予 兼商クプロシールド※	1,000~2,000倍	-	-
	コナガ・ハスモントウ アムシ・ハマダラメカガ 等	トルネードエースDF	1,000~2,000倍	7日前	2回
10月②	菌核病・株腐病	予 ロブルール水和剤	1,000倍	7日前	4回
	コナガ・ハスモントウ・アムシ ハマダラメカガ 等	アフーム乳剤	1,000~2,000倍	前日	3回
10月③	軟腐病・黒斑細菌病	予 スターナ水和剤	1,000倍	7日前	3回
	コナガ・ハスモントウ・オタバコガ ウバ 類 等	ブロフレアSC	2,000~4,000倍	前日	3回
10月④	黒腐病・軟腐病・株腐病	予 バリダシン液剤 5	800倍	7日前	5回
	アブラムシ類・コナガ ハマダラメカガ・アムシ 等	パダンSG水溶剤	1,500倍	14日前	4回

※結球期以降散布不可(薬害):結球あぶらな科葉菜類登録

弱った株の回復に!

茶葉から抽出した植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布!
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録: 生第91402号

白酢

POINT

育苗期・結球期の散布がお勧め!
発根を促進し、根張りが向上
灌注時: 100~300倍 散布時: 300~1,000倍

※強酸性のため100倍以下にならないように注意