



ミニトマト編

病害虫注意報 2021年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

マルハナバチ導入後のコナジラミ防除



黄化葉巻病(TYLCV)



黄化病(ToCV)



タバココナジラミ



オンシツコナジラミ

コナジラミは黄化葉巻病 (TYLCV) だけでなく、黄化病(ToCV)のウイルスも媒介します。
黄化葉巻耐病性品種でもコナジラミ防除を行いましょう！！

今月のおすすめローテーション

対象害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
10月 ①	コナジラミ類・トマトヒゲダニ	クリアザールフロアブル	2,000~4,000倍	前日	2回	1日
	コナジラミ類・うどんこ病 アブラムシ類・ハダニ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	-
10月 ②	コナジラミ類・トマトヒゲダニ ハダニ類	コロマイト乳剤	1,500倍	前日	2回	1日
10月 ③	コナジラミ類・アザミマダニ アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	前日	3回	1~3日
	コナジラミ類・うどんこ病 アブラムシ類・ハダニ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	-
10月 ④	タバココナジラミ類 トマトヒゲダニ等	ファインセーブフロアブル	1,000~2,000倍	前日	3回	1日

★マルハナバチ導入後のチョウ目害虫対策

対象害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
オオタバコガ・ハダニ類	プレバソフロアブル5	2,000倍	前日	3回	1日
ハスモンヨトウ・オオタバコガ コナジラミ類・ハダニ類等	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日
コナジラミ類・トマトヒゲダニ オオタバコガ・ハスモンヨトウ等	カスケード乳剤	2,000~4,000倍	前日	2回	2日

登録追加情報

カッパーシン水和剤

ミニトマトでも
使用可能になりました！

疫病・かいよう病・軟腐病
葉かび病・斑点細菌病・輪紋病
1,000倍/前日まで/5回以内



白酢

発根を促進！
根張り向上！

灌注時：100~300倍
散布時：300~1,000倍

※強酸性のため100倍以下にならないように注意



弱った株の回復に！

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録
第91402号