



# トマト編

## 病害虫注意報 2021年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### マルハナバチ導入後のコナジラミ防除



黄化葉巻病(TYLCV)



黄化病(ToCV)



タバココナジラミ



オンシツコナジラミ

コナジラミは黄化葉巻病 (TYLCV) だけでなく、黄化病(ToCV)のウイルスも媒介します。黄化葉巻耐病性品種でもコナジラミ防除を行いましょう！！

### 今月のおすすめローテーション

対象害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
10月 ①	コナジラミ類・トマトバグダニ	アプロードエースフロアブル	1,000~2,000倍	前日	3回	1日
10月 ②	コナジラミ類・トマトバグダニ ハダカアザミヤカ類	コロマイト乳剤	1,500倍	前日	2回	1日
10月 ③	コナジラミ類・アブラムシ類 アザミヤカ類	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	前日	3回	1~3日
	コナジラミ類・ハダカアザミヤカ類 アブラムシ類・うどんこ病	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	-
10月 ④	タバココナジラミ類 トマトバグダニ等	ファインセーブフロアブル	1,000~4,000倍	前日	3回	1日

### ★マルハナバチ導入後のチョウ目害虫対策

対象害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
オオタバコガ・ハダカアザミヤカ類	プレバソンフロアブル5	1,000~2,000倍	前日	3回	1日
ハスモンヨトウ・オオタバコガ コナジラミ類・ハダカアザミヤカ類 等	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日
コナジラミ類・トマトバグダニ オオタバコガ・ハスモンヨトウ 等	カスケード乳剤	2,000~4,000倍	前日	4回	2日

光合成能力UP!

## ファイトマジック

### 1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム

+各種微量元素

★葉にテリ、ツヤ・厚みUP!

★根に活力を与える!



肥料登録  
生第87201号

## 白酢

発根を促進!  
根張り向上!

灌注時: 100~300倍  
散布時: 300~1,000倍

※強酸性のため100倍以下にならないように注意



弱った株の回復に!

## カテキンパワー

### 1,000倍 葉面散布

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録  
生第91402号