



イチゴ編

病害虫注意報 2022年2月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



作終盤の病害虫の蔓延を防ぐために引き続き定期的な防除をしましょう！
特に、アザミウマ類は気温上昇と共に発生します。天敵への影響日数が少ない剤で、発生前からしっかりと防除しましょう。



収穫中 おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハ	ミコ	刊
1~2月頃	ハダニ類	【天敵】スパイデックス(チリカブリダニ) ※野菜類(施設栽培)登録 ・天敵導入後10~14日間は、葉かき及び薬剤散布は控え天敵の定着を促しましょう ・ダニが多い圃場は、2週続けて天敵を導入しましょう	100~300ml/10a (約2,000~6,000頭) 20~3,000頭/100株						
2月①	うどんこ病 炭疽病 灰色かび病	予・治 シグナムWDG	1,500~2,000倍 (うどんこ病・炭疽病2,000倍)	前日	2回	-		0日	-
	アザミウマ類	ファインセーブフロアブル	1,000~2,000倍	前日	3回	1日		0日	
2月②	うどんこ病 灰色かび病	予 フルピカフロアブル	2,000~3,000倍	前日	3回	0日		0日	
	アザミウマ類 ハモンヨトウ	カウンター乳剤	2,000倍	前日	4回	1日		0日	

ハダニの発生が多い場合は化学農薬のレスキュー防除をください

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
				ミツバチ	マルハ	ミコ	刊
ダニサラバフロアブル	1,000倍	前日	2回	1日		0日	
ニツソラン水和剤	2,000~3,000倍	前日	2回	0日	1日		0日

おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す！

NEW-SB酸素

- ☆ 土壌に酸素を供給し、根の活動を活発に！
- ☆ 肥料・葉面散布剤の吸収を良くします！

10kg/10a

7~14日おき灌水処理



チップバーン&軟化玉 予防に！

ファイトカル

1,000倍 7~14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを！！
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤液肥類などの混用は出来ません



肥料登録 生第83188号

ミツバチくん応援資材

カモンビービー

こんな時におすすめ！

- 低温や高温でハチが箱から出てこない
- 花が少なくハチが寄り付かない
- ハチが思う様に飛ばない
- 毎年着果不良や奇形果が多い

※使用方法など詳細はお問い合わせください！！

10パック入り

(10a標準使用量：6~12パック)

