



# ナス編

## 病害虫注意報 2022年2月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ミナミキイロアザミウマ・コナジラミ類等の発生が多くなりやすい時期です。発生を確認したら密度の低いうちに防除しましょう。



アザミウマ吸汁痕



アザミウマ類成虫



外コナジラミ成虫



内コナジラミ成虫

## おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数		
					ミツバチ	マルハナバチ	スズメバチ
灰色かび病・うどんこ病	ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日		0日
アザミウマ類・コナジラミ類 アブラムシ類 等	モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍 (コナジラミ類2,000倍)	前日	3回	1日	1~3日	7日
灰色かび病・すすかび病 うどんこ病 等	シグナムWDG	1,500倍 (すすかび病 1,500~2,000倍)	前日	3回	0日		0日
アザミウマ類・コナジラミ類 ハモトウ 等	ディアナSC	2,500~5,000倍 (コナジラミ類2,500倍)	前日	2回	3日	1~3日	14日以上
うどんこ病・灰色かび病 等	ポリオキシシAL水溶剤	5,000倍	前日	3回	3日	0日	21日
アザミウマ類・コナジラミ類 ハモトウ 等	カウンター乳剤	2,000~3,000倍 (アザミウマ類2,000倍)	前日	4回	1日		0日
灰色かび病・すすかび病 うどんこ病 等	アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日
アザミウマ類 外コナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	ファインセーブフロアブル	1,000~2,000倍 (外コナジラミ類1,000倍)	前日	3回	1日		0日

## 厳寒期対策おすすめ資材

光合成能力UP!

カルシウム補給に!

### ファイトオーツ&ファイトカル

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶ 転流促進 (糖度アップ)
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上

優れた展着性と浸透性!

ケリシハタの新配合!

尻腐れ果対策にもおすすめです!



肥料登録  
生第83241号

肥料登録  
生第83188号

## おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す!

### NEW-SB酸素

☆ 土壌に酸素を供給し、根の活動を活発に!

☆ 肥料・葉面散布剤の

吸収を良くします!

10kg/10a

7~14日おき灌水処理



⚠ アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロピン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類などとの混用はさけてください