



イチゴ編

病害虫注意報 2022年3月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ハダニ防除のポイント



卵の初期と成虫は薬が効きにくく、卵の末期と生まれたての幼虫が一番効きやすいです。

→ 卵から成虫が混在する多発時は、薬をしっかり効かせるために、3～5日間隔での薬剤散布をオススメします！

収穫中 おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハチ	ミヤコ	刊
3月 ①	うどんこ病	予・治 プロパティフロアブル	3,000～4,000倍	前日	3回	0日		-	
	ハダニ類	ダニサラバフロアブル 卵効果あり	1,000倍	前日	2回	1日		0日	
3月 ①	灰色かび病	予 ロブラル500アクア	1,000～1,500倍	前日	4回	1日		0日	
	アザミヤカ類	ファインセーブフロアブル	1,000～2,000倍	前日	3回	1日		0日	
3月 ②	灰色かび病 うどんこ病 輪斑病	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日	
	ハダニ類・コナジラミ類 うどんこ病・アブラムシ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日		0日	

萎れ・葉焼け対策に

ファイトカル

1,000倍 7～14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを!!
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤液肥類等との混用は出来ません



肥料登録 生第83188号

ミツバチくん応援資材

カモンビービー

こんな時におすすめ!

- 低温や高温でハチが箱から出てこない
- 花が少なくハチが寄り付かない
- ハチが思う様に飛ばない
- 毎年着果不良や奇形果が多い

10パック入り(10a標準使用量:6～12パック)

※使用方法など詳細はお問い合わせください!!

