



メロン編

病害虫注意報 2022年3月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

育苗期・定植時の防除特集

育苗期は苗立枯病が発生しやすいので、過湿にならないように注意しましょう！



害虫・病害の発生に応じて薬剤を散布しましょう！

対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 ミヅバチ	その他登録内容
アブラムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	3,000倍	3日前	2回	14日	ナジラミ類 2,000~3,000倍 アザミヤミ類2,000倍
	コルト顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	放飼不可	ナジラミ類
	チェス顆粒水和剤	5,000倍	3日前	4回	0日	
アブラムシ類 +ハダニ類	サンマイトフロアブル	1,000~1,500倍	3日前	2回	4日	うどんこ病 ナジラミ類
ハダニ類	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日	1回	1日	
	アグリメック	500~1,000倍	前日	3回	14日	アザミヤミ類 ナジラミ類
うどんこ病	ベルコートフロアブル	1,000倍	前日	5回	0日	つる枯病・菌核病

光合成能力UP! 植物本来の力を活性化

ファイトオーツー

▶ 転流量増加 **1,000倍**
▶ 毛細根の充実 **葉面散布**
▶ 抵抗性誘導物質の向上

肥料登録
生第83241号

白 酢

POINT

- ◆ 発根を促進し、根張りが向上
- ◆ 固定されたリン酸の吸収を促進
- ◆ 一時的なpHの抑制

灌注時：100~300倍 ※強酸性のため
散布時：300~1,000倍 100倍以下にならないように注意